

健診事業

3-1 健診事業

(1) 目的

疾病の早期発見及び疾病予防に対する意識の向上を図る。

(2) 健診の状況

健診名称		内 容	実施回数	受診者数
人間ドック		生活習慣病等を総合的に検査する健診		9,631
オープン検査	内臓脂肪測定	インピーダンス法測定による検査		1,474
	動脈硬化検査	血圧脈波による検査		2,952
	甲状腺検査	甲状腺機能ホルモンなどの検査		1,391
	BNP検査	心臓への負担の程度の検査		1,656
	胸部断層X線撮影	複数の角度から肺を撮影する検査		1,320
	喀痰検査	喀痰細胞診検査		1,641
	胃がんリスク検査	ペプシノゲン検査とヘリコバクター・ピロリ抗体検査	242	2,326
	前立腺がん検査	PSA値の検査		3,653
	腫瘍マーカー検査	主に肝臓、大腸、膵臓がんの検査		2,683
	女性腫瘍マーカー検査	主に卵巣がんの検査		1,182
骨密度検査(人間ドック受診時)		超音波測定による検査		4,599
特定健診・後期高齢者健診(人間ドック受診時)		人間ドック受診者のうち市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者を対象としたメタボリック健診		6,606
脳ドック		MR I・MRA・頸動脈超音波検査など	242	1,007
骨密度検査		骨密度検査のみを希望する者に月1回実施	12	128
乳がん検査		視触診と乳房X線撮影	102	2,749
		医師会依頼による乳房X線撮影	48	506
子宮がん検査		内診と子宮頸部細胞診	102	2,177
基本健診		労働安全衛生法に基づく健康診断と同等の健診	242	3,441
生活習慣病予防健診		職域などで健診を受診する機会の少ない人を対象とした特定健診と同等の健診	11	11

健診名称	内 容	(回・人)	
		実施回数	受診者数
ヤング健診	受診機会の少ない40歳未満を対象とした特定健診と同等の健診	163	395
ヤング健診 (保健センター実施分)		6	160
特定健診	市国民健康保険加入者を対象としたメタボリック健診	90	193
特定健診 (保健センター実施分)		6	328
計		1,266	52,209

表中、特に記載がないものは総合保健医療センターで実施

(3) 健診料金等

健診名称		対象者	料 金
人間ドック		40歳の市民(年度内1回限り)	4,000
		41歳以上の市民で市国民健康保険被保険者 または後期高齢者医療被保険者 (年度内1回限り)	7,000
		41歳以上の市民(年度内1回限り)	17,000
		上記以外の人	31,000
オ プ シ ョ ン 検 査	内臓脂肪測定	40歳以上の市民	1,000
		上記以外の人	2,000
	動脈硬化検査	40歳以上の市民	600
		上記以外の人	1,300
	甲状腺検査	40歳以上の市民	1,900
		上記以外の人	3,900
	BNP検査	40歳以上の市民	700
		上記以外の人	1,400
	胸部断層X線撮影	40歳以上の市民	2,100
		上記以外の人	4,200
	喀痰検査	40歳以上の市民	900
		上記以外の人	1,900
	胃がんリスク検査	40歳以上の市民	2,400
		うち、40・45・50・55・60・65・70・75歳の人	1,400
		上記以外の人	4,800
	前立腺がん検査	50歳以上の男性市民(年度内1回限り)	★600
上記以外の男性		2,300	
腫瘍マーカー検査	40歳以上の市民	1,800	
	上記以外の人	3,600	
女性腫瘍マーカー検査	40歳以上の女性市民	800	
	上記以外の女性	1,600	

		(円)	
健診名称	対象者	料 金	
脳ドック	50歳の市民（年度内1回限り）	10,000	
	うち、人間ドック受診後3か月以内に受診する人	7,000	
	上記以外の市民	34,000	
	うち、人間ドック受診後3か月以内に受診する人	24,000	
基本健診	市民または市内に事業所を有する事業主及びその従業者	4,500	
	上記以外の人	9,000	
生活習慣病予防健診	40歳以上の市民で市国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者を除く市民	3,000	
	上記以外の人	6,000	
ヤング健診	18歳以上39歳以下の市民	500	
特定健診	40歳以上の市民で市国民健康保険被保険者	無料	
骨密度検査	18歳以上の女性市民または30歳以上の男性市民（年度内1回限り）	★600	
	人間ドックの受診者で上記以外の人	2,900	
子宮がん検査	20歳以上の女性市民（年度内1回限り）	★1,300	
	人間ドックの受診者で上記以外の女性	5,000	
乳がん検査	30歳以上の女性市民（年度内1回限り）	★1,700	
	人間ドック受診者で上記以外の女性	3,000	

表中の年齢は、当該年度中（4月～翌年3月）に迎える誕生日での年齢
次の人は★印の受診料金が免除

- 1 当該年度3月末日において70歳以上の人
- 2 当該年度3月末日において69歳以下で次のいずれかに該当する人
 - ア 市国民健康保険被保険者
 - イ 後期高齢者医療被保険者
 - ウ 生活保護などの被保護世帯等の人
 - エ 世帯全員が市民税非課税の人

(4) 健診別検査項目一覧表

検査項目		人間ドック	脳ドック	基本健診	特定健診	生活習慣病予防健診	ヤング健診
健康調査		●	●	●	●	●	●
MRI			●				
MRA			●				
頸動脈超音波			●				
診察		●	■	●	●	●	●
身体計測	身長	●	●	●	●	●	●
	体重	●	●	●	●	●	●
	標準体重	●	●	●	●	●	●
	腹囲	●	●	●	●	●	●

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
	肥満度	●	●	●	●	●	●
	BMI	●	●	●	●	●	●
	体脂肪率	●	●				
視力		●		●			
眼圧		●					
眼底	動脈硬化性変化	●	■		▲	▲	
	高血圧性変化	●	■		▲	▲	
	K-W	●	■		▲	▲	
	糖尿病性変化	●	■		▲	▲	
聴力	1000Hz	●		●			
	4000Hz	●		●			
血圧	最高(収縮期)	●	■	●	●	●	●
	最低(拡張期)	●	■	●	●	●	●
血液一般	白血球数	●	■	●	●	●	●
	赤血球数	●	■	●	●	●	●
	血色素量	●	■	●	●	●	●
	ヘマトクリット	●	■	●	●	●	●
	血小板数	●	■	●	●	●	●
	MCV	●	■	●	●	●	●
	MCH	●	■	●	●	●	●
	MCHC	●	■	●	●	●	●
	白血球分画	●	■				
	血清鉄	●	■				
肝機能	総蛋白	●	■				
	アルブミン	●	■				
	A/G比	●	■				
	総ビリルビン	●	■				
	AST(GOT)	●	■	●	●	●	●
	ALT(GPT)	●	■	●	●	●	●
	γ-GT	●	■	●	●	●	●
	ALP	●	■				
	LD	●	■				
コリンエステラーゼ	●	■					
膵機能	アミラーゼ	●	■				
心筋・筋疾患	CK	●	■				
脂質代謝	総コレステロール	●	■				
	HDLコレステロール	●	■	●	●	●	●
	LDLコレステロール	●	■	●	●	●	●
	中性脂肪	●	■	●	●	●	●
糖代謝	空腹時血糖	●	■	●	●	●	●

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
	HbA1c	●	■	●	●	●	●
	尿糖	●	■	●	●	●	●
腎機能	尿素窒素	●	■				
	クレアチニン	●	■	●	●	●	●
	シスタチンC	●	■				
	eGFR creat	●	■	●	●	●	●
	尿アルブミン/Cr比	●					
尿一般	尿蛋白	●	■	●	●	●	●
	尿潜血	●	■	●	●	●	●
	ウロビリノーゲン	●	■				
	ケトン体	●	■				
	ビリルビン	●	■				
	pH	●	■				
	尿比重	●	■				
	亜硝酸塩	●	■				
	白血球	●	■				
尿沈渣	●	■					
痛風	尿酸	●	■				
免疫反応	CRP	●					
	RF	●					
感染症	HBs抗原	●					
	HCV抗体	●					
	脂質抗体	●					
	TP抗体	●					
便潜血	2日法	●					
肺機能	肺活量	●					
	%肺活量	●					
	努力性肺活量	●					
	努力性肺活量率	●					
	%1秒量	●					
安静心電図	12誘導	●	■	●	●	●	●
	心拍数	●	■	●	●	●	●
胸部X線	正面	●	■	●			
	側面	●					
	心胸郭比	●	■	●			
胃部X線	上部消化管	●					
腹部超音波		●					
血液型	ABO	●	■				
	Rh	●	■				

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
内臓脂肪	内臓脂肪面積	△					
動脈硬化	A B I	△					
	baPWV	△					
甲状腺	T S H	△					
	F T 3	△					
	F T 4	△					
B N P		△					
胸部断層 X 線		△					
喀痰細胞診		△					
胃がんリスク	ピロリ菌抗体定量	△					
	ペプシノゲン I	△					
	ペプシノゲン II	△					
	P G I / II	△					
前立腺がん	P S A	△					
腫瘍マーカー	A F P	△					
	C E A	△					
	C A 19-9	△					
女性腫瘍マーカー	C A 125	△					
骨密度	踵骨超音波	□					
乳がん検査	マンモグラフィ	○		○	○	○	○
子宮がん検査	頸部細胞診	○		○	○	○	○

□：人間ドックと同時に検査可能、骨密度：第2火曜日午後実施

■：脳ドックの検査項目について、3か月以内に人間ドックを受診している場合、重複する項目は省略

△：オプション設定

▲：前年度の健診結果により対象者が決定

○：水曜日のみ同時に検査可能


乳がん検査：火曜日午後、水曜日午後実施

子宮がん検査：火曜日午後実施

3-1-1 人間ドック ■


【年代別受診者数】

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790
合計	125	1,868	979	2,463	3,404	792	9,631



【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	761	866	843	850	837	711	881	818	736	734	778	816	9,631



診察




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		62	774	411	1,019	1,680	470	4,416
	女		50	956	496	1,265	1,382	191	4,340
B (軽度異常)	男		0	1	0	0	3	3	7
	女		0	0	0	3	2	0	5
C (要観察)	男		4	34	21	43	72	29	203
	女		7	77	39	82	102	18	325
D (要医療)	男		1	4	4	30	113	62	214
	女		1	20	8	21	50	19	119
合計	男		67	813	436	1,092	1,868	564	4,840
	女		58	1,053	543	1,371	1,536	228	4,789

身体計測

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		42	423	209	524	996	301	2,495
	女		48	769	391	977	1,038	150	3,373
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		25	391	227	568	872	263	2,346
	女		10	285	152	394	498	78	1,417
D (要医療)	男		0	0	0	0	0	0	—
	女		0	0	0	0	0	0	—
合計	男		67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

視力

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		34	341	158	271	266	28	1,098
	女		23	411	172	275	161	13	1,055
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		16	223	132	367	537	113	1,388
	女		14	302	147	424	404	37	1,328
D (要医療)	男		16	250	146	445	1,049	416	2,322
	女		21	340	222	658	953	176	2,370
合計	男		66	814	436	1,083	1,852	557	4,808
	女		58	1,053	541	1,357	1,518	226	4,753



聴力




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		66	720	311	505	465	51	2,118
	女		56	1,019	501	983	698	49	3,306
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	26	31	101	142	31	331
	女		0	14	11	116	181	17	339
D (要医療)	男		1	68	94	481	1,231	457	2,332
	女		2	21	29	264	641	155	1,112
合計	男		67	814	436	1,087	1,838	539	4,781
	女		58	1,054	541	1,363	1,520	221	4,757

血圧

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		53	605	233	373	480	108	1,852
	女		56	901	359	617	420	33	2,386
B (軽度異常)	男		10	100	74	233	431	100	948
	女		2	76	75	280	335	48	816
C (要観察)	男		4	84	94	352	682	243	1,459
	女		0	60	84	341	543	85	1,113
D (要医療)	男		0	24	35	134	274	113	580
	女		0	17	25	133	238	62	475
合計	男		67	813	436	1,092	1,867	564	4,839
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

血液一般

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		29	292	126	303	460	125	1,335
	女		21	327	205	558	615	73	1,799
B (軽度異常)	男		34	471	273	683	1,136	285	2,882
	女		27	444	262	664	719	102	2,218
C (要観察)	男		1	21	13	44	170	92	341
	女		2	118	24	65	120	29	358
D (要医療)	男		3	30	24	62	102	62	283
	女		8	165	52	84	82	24	415
合計	男		67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790



肝機能

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	42	409	231	639	1,142	308	2,771
	女	48	817	397	1,010	1,105	143	3,520
B (軽度異常)	男	13	134	80	176	294	71	768
	女	6	93	54	122	106	10	391
C (要観察)	男	10	138	64	164	287	145	808
	女	4	115	61	188	270	63	701
D (要医療)	男	2	133	61	113	145	40	494
	女	0	29	31	51	55	12	178
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

膵機能


(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	65	777	412	993	1,654	473	4,374
	女	55	1,013	515	1,271	1,428	202	4,484
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	2	26	16	64	125	55	288
	女	2	30	19	72	61	12	196
D (要医療)	男	0	11	8	35	89	36	179
	女	1	11	9	28	47	14	110
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790


心筋・筋疾患

(人)


判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	60	719	383	965	1,603	460	4,190
	女	55	954	476	1,221	1,335	186	4,227
B (軽度異常)	男	5	75	45	123	252	101	601
	女	3	98	66	147	197	41	552
C (要観察)	男	2	14	7	1	11	3	38
	女	0	2	0	1	3	0	6
D (要医療)	男	0	6	1	3	2	0	12
	女	0	0	1	2	1	1	5
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790



肝機能



膵機能



心筋・筋疾患

脂質代謝

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	30	279	146	377	803	279	1,914
	女	45	657	188	435	574	103	2,002
B (軽度異常)	男	17	219	128	322	544	148	1,378
	女	7	225	147	415	517	68	1,379
C (要観察)	男	14	243	129	331	437	108	1,262
	女	2	137	168	424	396	50	1,177
D (要医療)	男	6	73	33	62	84	29	287
	女	4	35	40	97	49	7	232
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

糖代謝




(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	28	272	71	144	219	49	783
	女	44	614	167	203	182	38	1,248
B (軽度異常)	男	31	414	212	459	705	238	2,059
	女	14	391	277	705	713	90	2,190
C (要観察)	男	6	117	117	370	717	213	1,540
	女	0	47	91	407	557	81	1,183
D (要医療)	男	2	11	36	119	227	64	459
	女	0	2	8	56	84	19	169
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

腎機能

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	63	745	339	700	919	193	2,959
	女	52	941	455	1,019	912	98	3,477
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	4	65	88	361	792	278	1,588
	女	6	109	84	340	572	104	1,215
D (要医療)	男	0	4	9	31	157	93	294
	女	0	4	4	12	52	26	98
合計	男	67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女	58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790



尿一般




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		51	578	300	717	1,128	298	3,072
	女		26	497	257	632	661	89	2,162
B (軽度異常)	男		6	79	36	88	131	42	382
	女		2	36	11	32	36	5	122
C (要観察)	男		6	97	50	128	254	93	628
	女		10	146	108	229	277	30	800
D (要医療)	男		4	60	49	154	351	126	744
	女		20	374	167	476	559	101	1,697
合計	男		67	814	435	1,087	1,864	559	4,826
	女		58	1,053	543	1,369	1,533	225	4,781

痛風

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		57	628	327	881	1,558	465	3,916
	女		58	1,041	537	1,342	1,484	213	4,675
B (軽度異常)	男		6	139	73	144	210	72	644
	女		0	8	5	18	40	11	82
C (要観察)	男		4	32	23	51	78	23	211
	女		0	5	1	10	11	4	31
D (要医療)	男		0	15	13	16	22	4	70
	女		0	0	0	1	1	0	2
合計	男		67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

免疫反応

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		62	716	366	894	1,529	440	4,007
	女		52	922	437	1,127	1,302	184	4,024
B (軽度異常)	男		2	35	26	58	83	27	231
	女		1	38	18	62	62	13	194
C (要観察)	男		2	50	40	125	212	77	506
	女		3	81	80	169	153	29	515
D (要医療)	男		1	13	4	15	44	20	97
	女		2	13	8	13	19	2	57
合計	男		67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790



感染症




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		65	790	423	1,060	1,782	543	4,663
	女		58	1,043	531	1,328	1,489	215	4,664
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		2	24	13	32	86	21	178
	女		0	11	12	43	47	13	126
合計	男		67	814	436	1,092	1,868	564	4,841
	女		58	1,054	543	1,371	1,536	228	4,790

肺機能

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		61	775	392	883	1,379	367	3,857
	女		54	1,014	525	1,260	1,350	192	4,395
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	11	18	65	151	66	311
	女		0	8	5	38	76	12	139
D (要医療)	男		6	27	23	128	295	120	599
	女		4	30	12	55	85	16	202
合計	男		67	813	433	1,076	1,825	553	4,767
	女		58	1,052	542	1,353	1,511	220	4,736

内臓脂肪

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		4	121	59	159	251	65	659
	女		3	99	79	195	196	38	610
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		1	27	23	52	61	13	177
	女		1	3	3	7	12	2	28
D (要医療)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
合計	男		5	148	82	211	312	78	836
	女		4	102	82	202	208	40	638



動脈硬化




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		3	173	97	274	456	103	1,106
	女		2	154	145	380	376	47	1,104
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	27	36	112	196	48	419
	女		0	17	22	108	134	26	307
D (要医療)	男		0	0	0	2	4	5	11
	女		0	0	0	3	1	1	5
合計	男		3	200	133	388	656	156	1,536
	女		2	171	167	491	511	74	1,416

甲状腺機能

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		3	111	67	164	232	50	627
	女		5	167	96	195	191	25	679
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		0	8	2	10	21	7	48
	女		1	4	8	12	10	2	37
合計	男		3	119	69	174	253	57	675
	女		6	171	104	207	201	27	716

BNP

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		5	138	90	170	187	28	618
	女		5	111	66	158	117	8	465
B (軽度異常)	男		0	5	9	51	110	27	202
	女		0	18	20	70	87	12	207
C (要観察)	男		0	1	0	5	3	1	10
	女		0	1	0	1	5	0	7
D (要医療)	男		0	0	1	12	54	26	93
	女		0	2	0	14	31	7	54
合計	男		5	144	100	238	354	82	923
	女		5	132	86	243	240	27	733



喀痰細胞診




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		5	162	89	243	497	140	1,136
	女		2	57	47	137	218	34	495
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	0	0	0	0	0	0
	女		0	0	0	0	0	0	0
D (要医療)	男		0	0	0	0	0	0	0
	女		0	0	0	0	0	0	0
F (判定不能)	男		0	2	2	2	2	0	8
	女		0	0	0	1	1	0	2
合計	男		5	164	91	245	499	140	1,144
	女		2	57	47	138	219	34	497

胃がんリスク

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		6	301	104	187	256	49	903
	女		5	428	106	187	197	9	932
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		1	43	13	47	124	29	257
	女		0	68	22	60	79	5	234
合計	男		7	344	117	234	380	78	1,160
	女		5	496	128	247	276	14	1,166

前立腺がん

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		9	146	340	939	1,523	416	3,373
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		0	2	4	53	151	70	280
合計	男		9	148	344	992	1,674	486	3,653





腫瘍マーカー

									(人)
判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計	
A (異常なし)	男	8	197	141	367	529	108	1,350	
	女	7	214	148	411	343	28	1,151	
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	
C (要観察)	男	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	
D (要医療)	男	0	12	6	32	47	18	115	
	女	0	7	7	20	25	8	67	
合計	男	8	209	147	399	576	126	1,465	
	女	7	221	155	431	368	36	1,218	



女性腫瘍マーカー

									(人)
判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計	
A (異常なし)	女	6	256	158	414	296	30	1,160	
B (軽度異常)	女	—	—	—	—	—	—	—	
C (要観察)	女	—	—	—	—	—	—	—	
D (要医療)	女	0	18	4	0	0	0	22	
合計	女	6	274	162	414	296	30	1,182	



年度別精密検査分析

検査	年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
							異常なし	がん	がん以外		
胃 部 X 線	26	7,500	507	6.76	383	75.54	45	11	327	0.15	2.17
	27	7,763	638	8.22	460	72.10	33	6	421	0.08	0.94
	28	8,042	658	8.18	448	68.09	36	9	403	0.11	1.37
	29	7,887	496	6.29	337	67.94	32	4	301	0.05	0.81
	30	7,662	451	5.89	307	68.07	17	7	283	0.09	1.55
胸 部 X 線	26	8,123	257	3.16	208	80.93	75	6	127	0.07	2.33
	27	8,691	169	1.94	127	75.15	34	3	90	0.03	1.78
	28	9,462	184	1.94	129	70.11	35	5	89	0.05	2.72
	29	9,494	588	6.19	450	76.53	134	4	312	0.04	0.68
	30	9,505	397	4.18	302	76.07	83	5	214	0.05	1.26
便 潜 血	26	8,131	653	8.03	456	69.83	127	16	313	0.20	2.45
	27	8,670	685	7.90	489	71.39	122	13	354	0.15	1.90
	28	9,448	728	7.71	469	64.42	142	21	306	0.22	2.88
	29	9,491	714	7.52	427	59.80	121	17	289	0.18	2.38
	30	9,492	648	6.83	422	65.12	113	17	292	0.18	2.62
超 音 波	26	8,199	482	5.88	346	71.78	108	4	234	0.05	0.83
	27	8,778	615	7.01	436	70.89	80	2	354	0.02	0.33
	28	9,563	694	7.26	447	64.41	88	4	355	0.04	0.58
	29	9,623	922	9.58	623	67.57	131	7	485	0.07	0.76
	30	9,629	939	9.75	642	68.37	166	9	467	0.09	0.96





— 胃部X線 — 胸部X線 — 便潜血 — 超音波

— 胃部X線 — 胸部X線 — 便潜血 — 超音波

便潜血

【検査結果】

判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	62	54	772	963	409	510	992	1,287	1,681	1,419	487	208	4,403	4,441
B (軽度異常)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (要観察)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (要医療)	3	2	34	56	24	21	85	67	169	102	71	14	386	262
合計	65	56	806	1,019	433	531	1,077	1,354	1,850	1,521	558	222	4,789	4,703



便潜血


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	3	2	34	56	24	21	85	67	169	102	71	14	386	262
精検受診者数	0	1	17	31	15	14	52	45	119	80	38	10	241	181
異常なし	0	1	4	16	4	9	11	15	15	22	12	4	46	67
大腸がん（早期）	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	2	0	10	1
大腸がん（進行）	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	3	2
大腸がん（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
大腸ポリープ（腺腫）	0	0	6	4	4	3	24	11	47	26	13	3	94	47
大腸ポリープ（過形成）	0	0	1	1	0	0	4	4	10	2	2	0	17	7
大腸ポリープ（不明）	0	0	1	1	2	0	3	5	12	7	3	0	21	13
大腸憩室	0	0	2	1	4	2	5	5	14	13	2	3	27	24
痔疾患	0	0	1	5	0	0	6	4	8	5	3	1	18	15
潰瘍性大腸炎	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	0
胃疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローン氏病	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の疾患	0	0	0	3	0	0	5	3	17	7	2	0	24	13

複数回答あり

(男)



(女)



便潜血

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	653	685	728	714	648
精検受診者数	456	489	469	427	422
精検受診率 (%)	69.8	71.4	64.4	59.8	65.1

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率		(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率
異常なし	127	122	142	121	113
	26.13%	23.51%	28.86%	26.08%	24.73%
大腸がん (早期)	10	8	11	8	11
	2.06%	1.54%	2.24%	1.72%	2.41%
大腸がん (進行)	4	4	9	7	5
	0.82%	0.77%	1.83%	1.51%	1.09%
大腸がん (不明)	2	1	1	2	1
	0.41%	0.19%	0.20%	0.43%	0.22%
大腸ポリープ (腺腫)	144	164	142	137	141
	29.63%	31.60%	28.86%	29.53%	30.85%
大腸ポリープ (過形成)	30	32	22	33	24
	6.17%	6.17%	4.47%	7.11%	5.25%
大腸ポリープ (不明)	52	61	36	27	34
	10.70%	11.75%	7.32%	5.82%	7.44%
大腸憩室	49	62	64	58	51
	10.08%	11.95%	13.01%	12.50%	11.16%
痔疾患	40	39	43	31	33
	8.23%	7.51%	8.74%	6.68%	7.22%
潰瘍性大腸炎	6	4	4	4	6
	1.23%	0.77%	0.81%	0.86%	1.31%
胃疾患	1	0	0	0	0
	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
クローン氏病	0	0	2	0	1
	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.22%
その他の疾患	21	22	16	36	37
	4.32%	4.24%	3.25%	7.76%	8.10%

便潜血検査の受診者数は、男性4,789人、女性4,703人で総受診者数は9,492人であり、判定別の男女計数はA (異常なし) 8,844人 (93.2%)、D (要医療) は648人 (6.8%) であった。

D (要医療) のうち、精検受診者数は422人であり、精検受診率*1は65.1%であった。

また、がん発見率*2は0.18%、陽性反応的中度*3は2.62%であった。



- *1 精検受診率とは、D (要医療) のうち精密検査を受けた者の割合
- *2 がん発見率とは、総受診者のうちがんが発見された者の割合
- *3 陽性反応的中度とは、D (要医療) のうちがんが発見された者の割合

眼底・眼圧

【検査結果】

(人)

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	52	56	616	887	297	382	557	757	752	646	173	70	2,447	2,798
B (軽度異常)	1	1	51	50	37	50	160	198	350	304	113	63	712	666
C (要観察)	3	0	35	25	23	35	106	134	245	193	81	36	493	423
D (要医療)	10	1	111	87	77	74	254	255	462	348	161	48	1,075	813
F (判定不能)	0	0	1	2	1	0	7	10	36	27	24	8	69	47
合計	66	58	814	1,051	435	541	1,084	1,354	1,845	1,518	552	225	4,796	4,747




【所見】

(件)

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	52	56	616	888	299	385	571	766	771	659	180	71	2,489	2,825
視神経乳頭陥凹	7	2	102	96	60	76	182	196	327	260	112	41	790	671
網膜異常	1	0	13	8	7	15	39	41	74	59	21	14	155	137
黄斑異常	0	0	24	11	15	21	100	106	201	114	55	10	395	262
詳細不明	0	0	1	2	1	0	10	11	40	29	27	9	79	51
網膜出血	0	0	5	4	12	4	36	28	56	53	26	3	135	92
視神経乳頭異常	2	0	7	11	5	7	15	23	49	26	18	2	96	69
視神経線維束欠損	2	0	8	4	6	9	21	21	23	19	5	1	65	54
白内障	0	0	0	1	0	1	8	21	36	54	19	9	63	86
黄斑変性	0	0	7	1	7	6	18	18	35	19	20	4	87	48
白斑	0	0	7	6	11	7	77	115	189	219	55	55	339	402
その他	2	0	34	26	18	22	65	88	168	125	69	24	356	285

複数回答あり



眼底・眼圧


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	10	1	111	87	77	74	254	255	462	348	161	48	1,075	813
精検受診者数	6	1	49	63	32	52	166	191	310	271	108	29	671	607
異常なし	1	1	3	18	6	10	21	23	29	32	12	2	72	86
白内障	0	0	0	0	1	3	23	30	68	68	27	6	119	107
緑内障	1	0	7	8	5	9	35	44	88	62	39	15	175	138
視神経乳頭陥凹	4	0	27	30	10	22	39	49	82	69	19	3	181	173
高眼圧症	0	0	1	3	0	2	3	5	9	5	0	3	13	18
黄斑上(前)膜	0	0	3	2	0	7	21	41	40	36	9	4	73	90
黄斑変性	0	0	2	0	4	1	12	6	24	9	10	2	52	18
糖尿病性網膜症	0	0	0	0	0	0	9	3	10	1	7	0	26	4
眼底出血	0	0	1	0	1	0	4	5	5	12	2	0	13	17
その他	2	0	11	6	8	10	27	29	59	56	18	6	125	107

複数回答あり

(男)



(女)



眼底・眼圧

【精密検査結果5年比較】					(人)
年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	1,223	1,305	1,601	1,708	1,888
精検受診者数	944	899	1,110	1,129	1,278
精検受診率 (%)	77.2	68.9	69.3	66.1	67.7

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	113	101	115	112	158
	9.70%	9.22%	8.38%	7.99%	9.83%
白内障	138	136	192	217	226
	11.85%	12.42%	13.98%	15.49%	14.06%
緑内障	256	257	317	307	313
	21.97%	23.47%	23.09%	21.91%	19.48%
視神経乳頭陥凹	226	191	290	296	354
	19.40%	17.44%	21.12%	21.13%	22.03%
高眼圧症	27	21	24	22	31
	2.32%	1.92%	1.75%	1.57%	1.93%
黄斑上(前)膜	104	106	104	136	163
	8.93%	9.68%	7.57%	9.71%	10.14%
黄斑変性	51	43	53	58	70
	4.38%	3.93%	3.86%	4.14%	4.36%
糖尿病性網膜症	31	29	34	32	30
	2.66%	2.65%	2.48%	2.28%	1.87%
眼底出血	30	28	20	35	30
	2.58%	2.56%	1.46%	2.50%	1.87%
その他	189	183	224	186	232
	16.22%	16.71%	16.31%	13.28%	14.44%

眼底検査、眼圧検査の受診者数は男性4,796人、女性4,747人で総受診者数は9,543人であり、判定別の男女計数はA(異常なし)は5,245人(55.0%)、B(軽度異常)は1,378人(14.4%)、C(要観察)は916人(9.6%)、D(要医療)は1,888人(19.8%)、F(判定不良)は116人(1.2%)であった。



D(要医療)のうち、精検受診者数は1,278人であり、精検受診率は67.7%であった。

また、平成30年度以前は、眼底検査と眼圧検査は、それぞれ単独で判定していたが、平成30年度から、眼圧検査のデータは、眼底読影時に眼底検査の判定をするための参考データと変更した。

心電図


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	29	43	437	750	236	356	559	884	738	872	166	99	2,165	3,004
B (軽度異常)	29	10	279	209	133	100	275	225	467	233	127	43	1,310	820
C (要観察)	7	3	73	69	47	56	170	191	390	303	152	51	839	673
D (要医療)	2	2	25	26	20	31	88	69	273	127	119	35	527	290
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,369	1,868	1,535	564	228	4,841	4,787



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	29	43	437	750	236	356	559	884	738	872	166	99	2,165	3,004
洞性徐脈	7	0	73	39	30	27	84	45	195	56	42	9	431	176
1度房室ブロック	2	1	5	8	15	12	53	39	198	60	78	10	351	130
非特異的T波異常	0	2	8	40	13	35	44	115	100	140	42	19	207	351
完全右脚ブロック	1	1	16	2	13	8	52	25	184	65	72	17	338	118
右室伝導遅延	1	0	25	15	9	5	26	33	46	41	17	6	124	100
左軸偏位	1	0	5	3	8	4	41	13	85	34	28	7	168	61
反時計軸回転	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
早期再分極	7	1	72	1	18	3	20	11	21	7	2	1	140	24
左室肥大	2	0	17	3	13	6	38	26	97	55	37	11	204	101
その他	19	10	183	201	93	91	208	213	372	267	139	59	1,014	841



心電図


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	2	25	26	20	31	88	69	273	127	119	35	527	290
精検受診者数	0	2	11	13	7	18	59	48	185	95	91	26	353	202
異常なし	0	1	7	8	3	7	13	21	46	22	14	3	83	62
不整脈	0	0	2	5	2	8	23	14	81	39	48	15	156	81
虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	10	3	23	7	8	0	41	10
心室伝導障害	0	0	0	0	0	1	0	2	12	6	12	0	24	9
心肥大	0	0	0	0	0	1	8	2	18	7	11	1	37	11
弁膜症	0	0	0	1	0	0	0	1	10	12	2	4	12	18
房室伝導障害	0	0	1	0	0	0	3	4	9	1	2	0	15	5
その他	0	1	1	0	2	1	3	1	10	12	7	3	23	18

複数回答あり

(男)



(女)



心電図

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	716	720	772	708	817
精検受診者数	472	487	514	475	555
精検受診率 (%)	65.9	67.6	66.6	67.1	67.9

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	134	120	112	118	145
	25.62%	22.39%	19.86%	22.61%	23.97%
不整脈	169	187	231	212	237
	32.31%	34.89%	40.96%	40.61%	39.17%
虚血性心疾患	45	55	53	51	51
	8.60%	10.26%	9.40%	9.77%	8.43%
心室伝導障害	31	31	35	28	33
	5.93%	5.78%	6.21%	5.36%	5.45%
心肥大	33	43	31	36	48
	6.31%	8.02%	5.50%	6.90%	7.93%
弁膜症	25	28	29	24	30
	4.78%	5.22%	5.14%	4.60%	4.96%
房室伝導障害	16	15	18	20	20
	3.06%	2.80%	3.19%	3.83%	3.31%
その他	70	57	55	33	41
	13.38%	10.63%	9.75%	6.32%	6.78%



心電図検査の受診者数は男性4,841人、女性4,787人で総受診者数は9,628人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は5,169人（53.7%）、B（軽度異常）は2,130人（22.1%）、C（要観察）は1,512人（15.7%）、D（要医療）は817人（8.5%）であった。

D（要医療）のうち精検受診者数は555人であり、精検受診率は67.9%であった。

胸部X線


【検査結果】

判定													(人)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	59	52	637	862	276	339	447	513	401	303	48	11	1,868	2,080
B (軽度異常)	6	4	141	162	135	176	497	706	1,094	946	336	139	2,209	2,133
C (要観察)	2	0	16	11	16	13	96	80	236	194	107	47	473	345
D (要医療)	0	0	16	8	9	8	40	47	106	67	66	30	237	160
合計	67	56	810	1,043	436	536	1,080	1,346	1,837	1,510	557	227	4,787	4,718



【所見】

所見													(件)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	59	52	637	862	276	339	447	513	401	303	48	11	1,868	2,080
石灰化陰影	0	0	4	5	6	5	22	34	98	80	37	18	167	142
網状陰影	0	0	0	0	0	0	7	2	35	8	24	3	66	13
胸膜肥厚・癒着陰影	3	1	44	59	31	54	115	197	223	188	83	33	499	532
孤立性結節陰影	0	0	17	8	7	7	25	26	47	34	17	8	113	83
大動脈の蛇行	0	0	1	1	2	4	31	37	115	104	47	26	196	172
大動脈の石灰化陰影	0	0	1	5	31	32	301	315	862	695	354	149	1,549	1,196
骨硬化陰影	0	0	10	4	7	1	11	12	26	10	10	1	64	28
心陰影の拡大	1	0	25	17	24	42	93	237	240	423	119	97	502	816
その他	4	5	80	97	62	72	148	185	237	164	55	18	586	541



胸部X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	16	8	9	8	40	47	106	67	66	30	237	160
精検受診者数	0	0	14	6	5	6	25	39	81	56	49	21	174	128
異常なし	0	0	7	3	4	2	7	14	23	13	8	2	49	34
非結核性炎症性肺疾患	0	0	0	1	0	1	5	14	16	14	5	5	26	35
原発性肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	1
陳旧性炎症性肺疾患	0	0	2	0	0	1	2	0	5	2	2	1	11	4
気管支拡張症	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	3	5
肺炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
陳旧性肺結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺気腫	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2	0	7	1
間質性肺炎・肺線維症	0	0	0	0	0	0	2	0	7	2	7	0	16	2
良性肺腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	3
非結核性抗酸菌症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	5	2	0	3	9	7	29	24	24	12	67	48

複数回答あり

(男)



(女)



胸部X線

【精密検査結果5年比較】					(人)
年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	257	169	184	588	397
精検受診者数	208	127	129	450	302
精検受診率 (%)	80.9	75.1	70.1	76.5	76.1

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	75	34	35	134	83
	35.21%	24.46%	31.53%	28.76%	26.02%
非結核性炎症性肺疾患	53	30	39	68	61
	24.88%	21.58%	35.14%	14.59%	19.12%
肺がん	6	3	5	4	5
	2.82%	2.16%	4.50%	0.86%	1.57%
陳旧性炎症性肺疾患	6	0	0	7	15
	2.82%	0.00%	0.00%	1.50%	4.70%
気管支拡張症	5	2	4	15	8
	2.35%	1.44%	3.60%	3.22%	2.51%
肺炎	4	3	1	3	1
	1.88%	2.16%	0.90%	0.64%	0.31%
陳旧性肺結核	3	0	1	5	0
	1.41%	0.00%	0.90%	1.07%	0.00%
肺気腫	3	1	4	21	8
	1.41%	0.72%	3.60%	4.51%	2.51%
間質性肺炎・肺線維症	2	5	2	19	18
	0.94%	3.60%	1.80%	4.08%	5.64%
良性肺腫瘍	2	6	5	6	5
	0.94%	4.32%	4.50%	1.29%	1.57%
非結核性抗酸菌症	1	2	1	0	0
	0.47%	1.44%	0.90%	0.00%	0.00%
その他	53	53	14	184	115
	24.88%	38.13%	12.61%	39.48%	36.05%

胸部X線検査の受診者数は男性4,787人、女性4,718人で総受診者数は9,505人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は3,948人（41.5%）、B（軽度異常）は4,342人（45.7%）、C（要観察）は818人（8.6%）、D（要医療）は397人（4.2%）であった。



D（要医療）のうち、精検受診者数は302人であり、精検受診率は76.1%であった。

また、がん発見率は0.05%、陽性反応的中度は1.26%であった。

胃部X線


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	48	33	464	452	202	169	276	290	314	246	73	28	1,377	1,218
B (軽度異常)	9	15	132	267	67	139	133	255	183	224	44	17	568	917
C (要観察)	7	4	136	167	112	120	439	405	843	530	270	98	1,807	1,324
D (要医療)	2	0	28	22	16	16	64	45	130	79	41	8	281	170
合計	66	52	760	908	397	444	912	995	1,470	1,079	428	151	4,033	3,629



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	48	33	464	452	202	169	276	289	314	245	73	28	1,377	1,216
胃ポリープ	4	13	112	264	64	138	130	261	178	211	51	25	539	912
萎縮性胃炎	3	1	68	98	47	68	257	266	545	375	171	70	1,091	878
慢性胃炎	6	2	86	64	58	42	195	132	309	155	91	29	745	424
十二指腸憩室	3	2	15	32	11	25	83	125	199	212	74	35	385	431
十二指腸潰瘍癒痕	5	1	37	8	22	17	43	20	63	28	17	4	187	78
胃潰瘍癒痕	0	0	3	2	10	6	30	9	64	11	20	3	127	31
胃潰瘍	0	0	0	1	0	0	1	2	11	4	3	1	15	8
胃粘膜下腫瘍	0	0	3	5	2	6	8	18	20	25	8	6	41	60
その他	1	8	68	167	60	113	239	409	521	521	172	80	1,061	1,298



胃部X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	0	28	22	16	16	64	45	130	79	41	8	281	170
精検受診者数	1	0	17	17	9	12	41	35	83	62	27	3	178	129
異常なし	0	0	1	3	1	2	0	3	4	2	1	0	7	10
慢性胃炎	0	0	8	6	1	1	17	11	28	27	12	1	66	46
萎縮性胃炎	0	0	6	4	1	0	11	9	25	12	3	1	46	26
びらん性胃炎	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	3	2
胃ポリープ	0	0	1	3	3	2	5	8	12	15	5	2	26	30
胃潰瘍	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	0	3	4	11	1	2	0	16	5
胃粘膜下腫瘍	0	0	2	2	1	3	3	5	4	5	2	1	12	16
十二指腸潰瘍	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	2	0	6	8
十二指腸ポリープ	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0
早期胃がん	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0
進行胃がん	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
食道がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	1	0	2	5	8	6	19	12	3	0	34	23

複数回答あり

(男)



(女)



胃部X線

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	507	638	658	496	451
精検受診者数	383	460	448	337	307
精検受診率 (%)	75.5	72.1	68.1	67.9	68.1
	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	45 8.91%	33 5.07%	36 6.45%	32 7.44%	17 4.28%
慢性胃炎	155 30.69%	176 27.04%	195 34.95%	138 32.09%	112 28.21%
萎縮性胃炎	30 5.94%	91 13.98%	64 11.47%	63 14.65%	72 18.14%
びらん性胃炎	9 1.78%	6 0.92%	7 1.25%	8 1.86%	5 1.26%
胃ポリープ	78 15.45%	79 12.14%	102 18.28%	62 14.42%	56 14.11%
胃潰瘍癒痕	24 4.75%	20 3.07%	18 3.23%	13 3.02%	3 0.76%
胃粘膜下腫瘍	26 5.15%	33 5.07%	25 4.48%	22 5.12%	21 5.29%
胃潰瘍	15 2.97%	4 0.61%	7 1.25%	9 2.09%	28 7.05%
十二指腸潰瘍	3 0.59%	3 0.46%	3 0.54%	3 0.70%	1 0.25%
十二指腸潰瘍癒痕	14 2.77%	22 3.38%	16 2.87%	11 2.56%	14 3.53%
十二指腸ポリープ	8 1.58%	5 0.77%	3 0.54%	7 1.63%	4 1.01%
進行胃がん	3 0.59%	1 0.15%	5 0.90%	2 0.47%	6 1.51%
食道がん	4 0.79%	0 0.00%	2 0.36%	1 0.23%	1 0.25%
早期胃がん	4 0.79%	5 0.77%	2 0.36%	1 0.23%	0 0.00%
その他	87 17.23%	173 26.57%	73 13.08%	58 13.49%	57 14.36%

胃部X線検査の受診者数は男性4,033人、女性3,629人で総受診者数は7,662人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は2,595人（33.9%）、B（軽度異常）は1,485人（19.4%）、C（要観察）は、3,131人（40.9%）、D（要医療）は451人（5.8%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は307人であり、精検受診率は68.1%であった。

また、がん発見率は0.08%、陽性反応的中度は1.33%であった。

腹部超音波 肝臓


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	49	47	425	726	160	266	379	609	691	685	251	100	1,955	2,433
B (軽度異常)	5	4	75	153	80	124	231	359	536	424	163	80	1,090	1,144
C (要観察)	12	3	282	112	180	140	461	382	598	395	139	42	1,672	1,074
D (要医療)	1	4	32	63	16	13	21	20	42	32	11	6	123	138
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	49	47	425	726	160	266	379	609	691	685	251	100	1,955	2,433
肝のう胞	5	3	129	171	138	160	397	475	713	579	203	94	1,585	1,482
脂肪肝	12	2	269	86	170	105	417	322	501	331	112	27	1,481	873
肝血管腫	1	5	49	91	30	52	64	76	103	81	24	13	271	318
肝内石灰化	0	1	7	5	8	6	45	40	110	56	36	11	206	119
慢性肝炎	0	0	0	0	2	0	2	0	9	2	1	0	14	2
門脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	1
肝腫瘍	0	0	3	2	4	1	4	2	8	5	3	2	22	12
肝硬変	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0
その他	1	4	40	67	17	15	34	35	76	50	30	13	198	184



腹部超音波 肝臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	1	4	32	63	16	13	21	20	42	32	11	6	123	138
精検受診者数	0	3	20	41	9	8	14	15	31	27	8	4	82	98
異常なし	0	0	5	7	1	0	4	6	4	3	1	1	15	17
肝細胞がん	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1
管内胆管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
転移性肝腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
肝血管腫	0	3	14	30	7	7	7	7	12	13	3	2	43	62
肝のう胞	0	0	0	2	1	1	1	3	7	7	2	0	11	13
肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
肝硬変	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
門脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	3	0	0	2	1	8	7	3	0	15	11

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 肝臓

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	79	166	172	213	261
精検受診者数	57	123	120	140	180
精検受診率 (%)	72.2	74.1	69.8	65.7	69.0

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率			
異常なし	12	14	10	10	32
	18.18%	10.45%	7.63%	6.37%	16.49%
肝臓がん	3	1	0	1	3
	4.55%	0.75%	0.00%	0.64%	1.55%
肝腫瘍	0	0	0	1	1
	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	0.52%
転移性肝腫瘍	0	0	0	1	1
	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	0.52%
肝血管腫	17	64	77	79	105
	25.76%	47.76%	58.78%	50.32%	54.12%
肝のう胞	10	25	15	41	24
	15.15%	18.66%	11.45%	26.11%	12.37%
肝炎	2	1	2	1	1
	3.03%	0.75%	1.53%	0.64%	0.52%
肝硬変	3	0	1	2	1
	4.55%	0.00%	0.76%	1.27%	0.52%
門脈瘤	1	0	1	1	0
	1.52%	0.00%	0.76%	0.64%	0.00%
その他	18	29	25	20	26
	27.27%	21.64%	19.08%	12.74%	13.40%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は4,388人（45.6%）、B（軽度異常）は2,234人（23.2%）、C（要観察）は2,746人（28.5%）、D（要医療）は261人（2.7%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は180人であり、精検受診率は69.0%であった。

また、がん発見率は0.03%、陽性反応的中度は1.15%であった。

腹部超音波 胆のう


【検査結果】

判定													(人)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	51	43	567	830	271	396	631	956	1,103	1,032	327	165	2,950	3,422
B (軽度異常)	12	10	157	158	90	95	211	209	356	229	105	23	931	724
C (要観察)	2	1	65	44	54	39	199	167	340	228	115	31	775	510
D (要医療)	2	4	25	22	21	13	51	38	68	47	17	9	184	133
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

所見													(件)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	51	43	567	830	271	396	631	956	1,103	1,032	327	165	2,950	3,422
胆のうポリープ	12	10	207	170	105	93	249	223	367	229	86	16	1,026	741
胆石	1	4	24	21	28	21	124	102	184	135	71	17	432	300
総胆管拡張 (手術後含む)	0	0	2	2	2	5	11	28	70	73	26	19	111	127
胆泥	0	0	2	7	1	4	13	19	22	17	9	2	47	49
胆のう腺筋腫症	1	0	8	8	9	4	39	21	47	19	7	1	111	53
胆のう腫瘍	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	1	0	6	3
慢性胆のう炎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
その他	3	2	29	32	46	32	143	97	256	130	74	19	551	312



腹部超音波 胆のう


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	4	25	22	21	13	51	38	68	47	17	9	184	133
精検受診者数	1	3	11	12	9	10	30	27	44	34	12	6	107	92
異常なし	1	0	0	1	1	1	4	7	8	6	3	3	17	18
胆のうがん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆石	0	3	7	5	3	5	13	10	22	20	6	1	51	44
胆のう腺筋腫症	0	0	4	5	5	3	11	7	11	6	1	1	32	22
胆のうポリープ	0	0	4	1	0	2	4	1	3	0	0	0	11	4
胆泥	0	0	1	1	0	0	2	2	0	3	0	0	3	6
胆のう炎	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0
総胆管拡張（手術後含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1
その他	0	1	1	0	0	0	0	3	4	4	1	1	6	9

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 胆のう

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	150	232	240	354	317
精検受診者数	117	168	146	218	199
精検受診率 (%)	78.0	72.4	60.8	61.6	62.8

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
異常なし	36 27.69%	25 12.76%	26 16.15%	48 18.60%	35 15.22%
胆のうがん	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.39%	0 0.00%
胆管がん	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
胆のう腫瘍	1 0.77%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
胆管腫瘍	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
胆石	39 30.00%	87 44.39%	75 46.58%	98 37.98%	95 41.30%
胆のう腺筋腫症	11 8.46%	26 13.27%	22 13.66%	45 17.44%	54 23.48%
胆のうポリープ	11 8.46%	21 10.71%	10 6.21%	26 10.08%	15 6.52%
胆泥	4 3.08%	9 4.59%	5 3.11%	4 1.55%	9 3.91%
胆のう炎	2 1.54%	1 0.51%	2 1.24%	2 0.78%	3 1.30%
総胆管拡張	4 3.08%	14 7.14%	4 2.48%	13 5.04%	4 1.74%
その他	22 16.92%	13 6.63%	17 10.56%	21 8.14%	15 6.52%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は6,372人（66.2%）、B（軽度異常）は1,655人（17.2%）、C（要観察）は1,285人（13.3%）、D（要医療）は317人（3.3%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は199人であり、精検受診率は62.8%であった。

なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

腹部超音波 膵臓


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	64	56	794	1,046	422	534	1,022	1,327	1,687	1,417	487	191	4,476	4,571
B (軽度異常)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0
C (要観察)	3	1	16	4	11	5	51	20	131	72	63	24	275	126
D (要医療)	0	1	4	4	2	4	19	23	47	47	13	13	85	92
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	64	56	794	1,046	422	534	1,022	1,327	1,687	1,417	487	191	4,476	4,571
膵のう胞	0	1	1	6	3	5	17	28	52	87	25	22	98	149
膵管拡張	0	0	1	0	1	2	19	11	59	26	16	17	96	56
膵管内乳頭粘液産生腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
慢性膵炎	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
膵石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
膵腫瘍	0	0	1	0	0	0	1	0	6	4	1	0	9	4
その他	3	1	17	2	10	2	37	3	73	5	39	2	179	15



腹部超音波 膵臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	1	4	4	2	4	19	23	47	47	13	13	85	92
精検受診者数	0	1	0	4	2	2	14	19	33	35	9	11	58	72
異常なし	0	0	0	0	1	1	10	5	18	13	2	5	31	24
膵臓がん	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
膵臓腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
膵管内乳頭粘液産生腫瘍	0	0	0	2	0	0	1	6	3	7	2	0	6	15
膵のう胞	0	1	0	2	1	1	3	6	6	12	4	5	14	27
膵管拡張	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	5	1
膵炎	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	3	3

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 膵臓

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	79	78	99	160	177
精検受診者数	64	60	73	132	130
精検受診率 (%)	81.0	76.9	73.7	82.5	73.4

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
異常なし	23 34.33%	22 36.67%	33 44.00%	53 37.59%	55 41.04%
膵臓がん	1 1.49%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.71%	3 2.24%
膵臓腫瘍	0 0.00%	2 3.33%	0 0.00%	2 1.42%	1 0.75%
膵管内乳頭粘液 産生腫瘍	12 17.91%	12 20.00%	17 22.67%	27 19.15%	21 15.67%
膵のう胞	16 23.88%	10 16.67%	19 25.33%	36 25.53%	41 30.60%
膵管拡張	5 7.46%	6 10.00%	1 1.33%	12 8.51%	6 4.48%
膵炎	2 2.99%	3 5.00%	0 0.00%	4 2.84%	1 0.75%
その他	8 11.94%	5 8.33%	5 6.67%	6 4.26%	6 4.48%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は9,047人（93.9%）、B（軽度異常）は4人（0.1%）、C（要観察）は401人（4.2%）、D（要医療）は177人（1.8%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は130人であり、精検受診率は73.4%であった。
また、がん発見率は0.03%、陽性反応的中度は1.69%であった。

腹部超音波 腎臓

【検査結果】

(人)


判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	62	56	619	898	267	421	481	917	680	860	151	120	2,260	3,272
B (軽度異常)	5	2	182	142	150	108	574	412	1,098	617	369	94	2,378	1,375
C (要観察)	0	0	8	9	13	9	30	31	73	53	36	11	160	113
D (要医療)	0	0	5	5	6	5	7	10	16	6	8	3	42	29
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

(件)

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	62	56	619	899	268	421	486	920	684	863	154	120	2,273	3,279
腎のう胞	3	2	118	93	106	83	512	321	1,014	538	372	92	2,125	1,129
腎結石	2	1	101	61	96	51	247	162	421	209	128	27	995	511
腎血管筋脂肪腫	0	0	4	9	3	7	11	24	25	18	7	2	50	60
腎障害	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	5	1	16	3
水腎症	0	0	1	0	0	0	2	2	1	4	3	0	7	6
慢性腎不全	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	5	1
腎腫瘍	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0	0	1	6	4
副腎腫瘍	0	0	1	0	2	0	2	1	7	5	0	3	12	9
その他	0	0	5	19	7	8	22	39	58	62	41	11	133	139



腹部超音波 腎臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	5	5	6	5	7	10	16	6	8	3	42	29
精検受診者数	0	0	3	2	2	5	4	8	9	3	5	1	23	19
異常なし	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	1	1	6	4
腎細胞がん	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
腎盂がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腎腫瘍	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
副腎腫瘍	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
腎のう胞	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	3	2
腎血管筋脂肪腫	0	0	2	0	1	2	0	3	2	0	0	0	5	5
慢性腎臓病	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
腎結石	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	3
水腎症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
尿管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尿管結石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
その他	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3	0	6	1

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 腎臓

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	59	53	72	91	71
精検受診者数	36	28	43	51	42
精検受診率 (%)	61.0	52.8	59.7	56.0	59.2

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	9	6	7	10	10
	21.43%	20.69%	14.89%	18.18%	21.74%
腎臓がん	0	0	0	0	2
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%
腎腫瘍	1	0	1	2	2
	2.38%	0.00%	2.13%	3.64%	4.35%
副腎腫瘍	1	2	2	0	2
	2.38%	6.90%	4.26%	0.00%	4.35%
腎のう胞	12	4	9	12	5
	28.57%	13.79%	19.15%	21.82%	10.87%
腎血管筋脂肪腫	5	5	5	10	10
	11.90%	17.24%	10.64%	18.18%	21.74%
慢性腎臓病	2	0	4	2	2
	4.76%	0.00%	8.51%	3.64%	4.35%
腎結石	2	2	4	2	4
	4.76%	6.90%	8.51%	3.64%	8.70%
水腎症	3	1	1	1	1
	7.14%	3.45%	2.13%	1.82%	2.17%
尿管がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
尿管結石	0	2	2	0	1
	0.00%	6.90%	4.26%	0.00%	2.17%
その他	7	7	12	16	7
	16.67%	24.14%	25.53%	29.09%	15.22%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は5,532人（57.5%）、B（軽度異常）は3,753人（39.0%）、C（要観察）は273人（2.8%）、D（要医療）は71人（0.7%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は42人であり、精検受診率は59.2%であった。

また、がん発見率は0.02%、陽性反応的中度は2.82%であった。

腹部超音波 脾臓

【検査結果】


判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	64	57	782	998	414	516	1,034	1,322	1,776	1,467	528	216	4,598	4,576
B (軽度異常)	3	1	29	56	20	26	56	45	85	67	36	12	229	207
C (要観察)	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	5	3
D (要医療)	0	0	3	0	1	0	1	2	3	1	0	0	8	3
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	64	57	782	998	414	516	1,034	1,322	1,776	1,467	529	216	4,599	4,576
副脾	2	1	13	47	5	19	15	23	19	15	3	1	57	106
脾石灰化	0	0	2	2	1	0	3	4	8	4	3	1	17	11
脾臓腫大	0	0	4	4	7	1	7	1	7	3	1	1	26	10
脾のう胞	0	0	4	1	2	3	2	4	2	3	2	0	12	11
脾血管腫	0	0	1	0	0	0	1	3	2	2	0	0	4	5
脾膿瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	8	2	8	5	31	14	56	44	26	9	130	74

複数回答あり



腹部超音波 脾臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	3	0	1	0	1	2	3	1	0	0	8	3
精検受診者数	0	0	3	0	1	0	1	2	2	1	0	0	7	3
異常なし	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾のう胞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾血管腫	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
脾腫	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
副脾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 脾臓

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	
要精検者数	4	7	4	5	11	
精検受診者数	3	5	2	4	10	
精検受診率 (%)	75.0	71.4	50.0	80.0	90.9	

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	2	2	0	1	3
	66.67%	40.00%	0.00%	25.00%	30.00%
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
脾腫瘍	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
脾のう胞	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
脾血管腫	0	0	0	0	1
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%
脾腫	0	1	0	0	2
	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%
副脾	0	0	0	1	0
	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%
その他	1	2	2	2	4
	33.33%	40.00%	100.00%	50.00%	40.00%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は9,174人（95.3%）、B（軽度異常）は436人（4.5%）、C（要観察）は8人（0.1%）、D（要医療）は11人（0.1%）であった。また、A（異常なし）における大半は描出範囲内異常なしであった。



D（要医療）のうち精検受診者数は、10人であり、精検受診率は90.9%であった。

なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

腹部超音波 その他


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	66	45	784	774	404	401	872	1,168	1,248	1,333	329	190	3,703	3,911
B (軽度異常)	1	4	25	57	19	38	131	82	336	104	90	11	602	296
C (要観察)	0	6	4	162	9	89	79	110	248	86	134	18	474	471
D (要医療)	0	3	1	61	4	15	10	10	35	13	11	9	61	111
合計	67	58	814	1,054	436	543	1,092	1,370	1,867	1,536	564	228	4,840	4,789



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	66	45	784	774	404	401	872	1,168	1,248	1,333	329	190	3,703	3,911
前立腺石灰化	0	-	13	-	9	-	66	-	156	-	55	-	299	-
前立腺肥大	0	-	3	-	15	-	108	-	325	-	128	-	579	-
子宮筋腫	-	6	-	169	-	119	-	131	-	83	-	4	-	512
卵巣のう腫	-	2	-	59	-	18	-	19	-	32	-	10	-	140
腹部大動脈石灰化	0	0	0	2	0	1	23	25	94	50	50	12	167	90
腹部大動脈瘤	0	0	0	0	0	0	3	1	16	1	11	1	30	3
膀胱憩室	0	0	1	0	2	0	3	3	6	5	10	1	22	9
膀胱ポリープ	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	5	1
その他	1	6	13	81	10	18	41	31	150	49	63	15	278	200



腹部超音波 その他


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	3	1	61	4	15	10	10	35	13	11	9	61	111
精検受診者数	0	2	1	44	2	11	6	6	20	7	7	4	36	74
異常なし	0	0	1	20	0	5	2	2	8	4	4	1	15	32
膀胱がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
膀胱腫瘍	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
婦人科腫瘍	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6
膀胱結石	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
前立腺肥大	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	4	0	11	0
子宮筋腫	0	0	0	12	0	3	0	1	0	1	0	0	0	17
卵巣のう腫	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	8
腹部大動脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
その他の泌尿器疾患	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他の婦人科疾患	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
その他の血管疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
その他のがん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	3	0	4	1	3	0	0	4	2	0	0	5	12

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 その他

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	111	113	154	166	172
精検受診者数	69	77	90	112	110
精検受診率 (%)	62.2	68.1	58.4	67.5	64.0

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率			
異常なし	26	20	23	35	47
	36.11%	25.32%	24.47%	29.41%	39.50%
膀胱がん	0	0	0	2	0
	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%	0.00%
前立腺がん	0	1	0	0	0
	0.00%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%
婦人科がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
膀胱腫瘍	1	2	3	2	2
	1.39%	2.53%	3.19%	1.68%	1.68%
婦人科腫瘍	2	7	6	7	6
	2.78%	8.86%	6.38%	5.88%	5.04%
膀胱結石	0	0	1	1	1
	0.00%	0.00%	1.06%	0.84%	0.84%
前立腺肥大	8	6	5	12	11
	11.11%	7.59%	5.32%	10.08%	9.24%
子宮筋腫	17	7	17	17	17
	23.61%	8.86%	18.09%	14.29%	14.29%
卵巣のう腫	2	8	11	7	8
	2.78%	10.13%	11.70%	5.88%	6.72%
腹部大動脈瘤	4	7	4	4	3
	5.56%	8.86%	4.26%	3.36%	2.52%
その他の泌尿器疾患	1	1	2	0	1
	1.39%	1.27%	2.13%	0.00%	0.84%
その他の婦人科疾患	3	2	7	2	4
	4.17%	2.53%	7.45%	1.68%	3.36%
その他の血管疾患	6	9	4	2	2
	8.33%	11.39%	4.26%	1.68%	1.68%
その他のがん	0	0	0	1	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	0.00%
その他	2	9	11	27	17
	2.78%	11.39%	11.70%	22.69%	14.29%

腹部超音波検査の受診者数は男性4,840人、女性4,789人で総受診者数は9,629人あり、判定別の男女計数はA(異常なし)は7,614人(79.1%)、B(軽度異常)は898人(9.3%)、C(要観察)は945人(9.8%)、D(要医療)は172人(1.8%)であった。



D(要医療)のうち精検受診者数は110人であり、精検受診率は64.0%であった。

なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

胸部断層X線


【検査結果】

判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	3	2	103	73	52	40	80	54	51	32	5	0	294	201
B (軽度異常)	0	0	29	12	25	21	95	91	180	115	58	19	387	258
C (要観察)	0	0	5	6	3	5	14	12	42	20	14	3	78	46
D (要医療)	0	0	6	3	1	1	6	5	19	3	6	6	38	18
合計	3	2	143	94	81	67	195	162	292	170	83	28	797	523



【所見】

所見	(件)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	3	2	103	73	52	40	80	54	51	32	5	0	294	201
石灰化陰影	0	0	0	0	0	0	3	4	16	10	5	2	24	16
網状陰影	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	9	0
胸膜肥厚・癒着陰影	0	0	13	6	8	10	26	28	51	26	15	2	113	72
孤立性結節陰影	0	0	11	6	1	5	10	12	30	15	9	6	61	44
癒痕像	0	0	6	2	3	3	20	8	34	16	17	5	80	34
嚢胞状陰影	0	0	0	1	3	1	5	2	12	2	3	1	23	7
大動脈の石灰化陰影	0	0	0	0	6	1	47	47	149	82	51	19	253	149
リンパ節石灰化	0	0	3	0	1	0	1	0	5	1	0	0	10	1
その他	0	0	10	7	10	7	18	19	24	26	8	3	70	62



胸部断層X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	6	3	1	1	6	5	19	3	6	6	38	18
精検受診者数	0	0	5	3	0	1	4	5	13	3	4	4	26	16
異常なし	0	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	6	2
非結核性炎症性肺疾患	0	0	0	2	0	1	2	2	2	2	2	2	6	9
陳旧性炎症性肺疾患	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
胸膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
原発性肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
縦隔腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
気管支拡張症	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
その他	0	0	2	1	0	0	2	2	4	0	1	1	9	4

複数回答あり

(男)




(女)



【総合判定】


判定	(人)		
	男	女	合計
A (異常なし)	0	2	2
B (軽度異常)	24	35	59
C (要観察)	487	569	1,056
D (要医療)	4,330	4,184	8,514
合計	4,841	4,790	9,631



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	214	119	333
身体計測	-	-	-
視力	2,322	2,370	4,692
眼圧	2	0	2
眼底	1,075	813	1,888
聴力	2,332	1,112	3,444
血圧	580	475	1,055
血液一般	283	415	698
肝機能	494	178	672
膵機能	179	110	289
心筋・筋疾患	12	5	17
脂質代謝	287	232	519

検査項目	(人)		
	男	女	合計
糖代謝	459	169	628
腎機能	294	98	392
尿一般	744	1,697	2,441
痛風	70	2	72
免疫反応	97	57	154
感染症	178	126	304
便潜血	386	262	648
肺機能	599	202	801
心電図	527	290	817
胸部X線	237	160	397
胃部X線	281	170	451
腹部超音波	472	467	939



【BMI と腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）：標準

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	2,495	3,373	5,868
C1群（要観察）	185	536	721
C2群（要観察）	2,161	881	3,042
合計	4,841	4,790	9,631




【BMI と腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風の4項目に対する判定）】


【A群】

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	7	24	59	293	9	35	10	28	16	20	4	2	105	402
B（軽度異常）	22	18	175	302	62	142	127	250	202	233	39	19	627	964
C（要観察）	10	2	154	140	107	170	282	522	530	570	168	80	1,251	1,484
D（要医療）	3	4	35	34	31	44	105	177	248	215	90	49	512	523
合計	42	48	423	769	209	391	524	977	996	1,038	301	150	2,495	3,373

(男)



(女)




【C1群】


(人)

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	3	6	13	69	1	9	1	7	7	3	0	1	25	95
B (軽度異常)	1	2	10	57	3	29	11	43	15	34	4	3	44	168
C (要観察)	0	0	3	12	3	21	14	70	41	97	12	10	73	210
D (要医療)	0	0	1	5	1	4	9	19	23	29	9	6	43	63
合計	4	8	27	143	8	63	35	139	86	163	25	20	185	536

(男) 年齢



(女) 年齢




【C2群】


(人)

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	1	1	21	22	2	4	3	1	5	2	0	0	32	30
B (軽度異常)	5	1	105	51	44	22	66	34	88	51	23	6	331	165
C (要観察)	10	0	156	56	103	42	290	151	431	189	130	28	1,120	466
D (要医療)	5	0	82	13	70	21	174	69	262	93	85	24	678	220
合計	21	2	364	142	219	89	533	255	786	335	238	58	2,161	881

(男) 年齢




(女) 年齢



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)		
	男	女	合計
血圧	26	34	60
脂質代謝	12	22	34
糖代謝	9	9	18
痛風	3	0	3

C2群	(人)		
	男	女	合計
血圧	269	132	401
脂質代謝	170	55	225
糖代謝	290	63	353
痛風	42	1	43



人間ドックの受診者数は男性4,841人、女性4,790人で総受診者数は9,631人であり、総合判定別ではA（異常なし）が2人（0.1%）、B（軽度異常）が59人（0.6%）、C（要観察）が1,056人（11.0%）、D（要医療）が8,514人（88.3%）であった。聴力・視力・尿一般の3項目でD（要医療）が多く、視力が4,692人（55.1%）、聴力が3,444人（40.5%）、尿一般が2,441人（28.7%）となり、結果的に総合判定に大きく反映されていると考えられる。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率

A群（異常なし）は5,868人（60.9%）、C1群（要観察）は721人（7.5%）、C2群（要観察）は3,042人（31.6%）であった。

BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風の4項目に対する判定）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性1,251人、女性1,484人で合計2,735人（46.6%）、D（要医療）は男性512人、女性523人で合計1,035人（17.6%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性73人、女性210人で合計283人（39.3%）、D（要医療）は男性43人、女性63人で合計106人（14.7%）であった。C2群（要観察）においては、C（要観察）は男性1,120人、女性466人で合計1,586人（52.1%）、D（要医療）は男性678人、女性220人で合計898人（29.5%）であった。


また、C1群（要観察）とC2群（要観察）においてD（要医療）と判定された人のうち、血圧と脂質代謝ではC1群（要観察）の方がC2群（要観察）より割合が高くなっている一方で、糖代謝と痛風ではC2群（要観察）の方がC1群（要観察）より割合が高くなっており、特に糖代謝ではその傾向が顕著となっている。

3-1-2 脳ドック ■

【年代別受診者数】

(人)


性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	4	35	149	116	159	44	507
女	1	27	210	130	112	20	500
合計	5	62	359	246	271	64	1,007



【月別受診者数】

(人)



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	94	99	96	101	104	76	94	89	74	62	62	56	1,007



MR I

【検査結果】



判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	1	0	4	8	11	44	4	5	1	1	0	0	21	58
B (軽度異常)	3	1	27	18	109	146	61	95	72	63	18	12	290	335
C (要観察)	0	0	1	0	7	3	25	16	43	27	7	2	83	48
D (要医療)	0	0	3	1	22	17	26	14	43	21	19	6	113	59
合計	4	1	35	27	149	210	116	130	159	112	44	20	507	500



MR A

【検査結果】



判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	4	1	28	21	117	183	81	89	99	76	22	7	351	377
B (軽度異常)	0	0	3	5	27	21	25	29	37	24	11	7	103	86
C (要観察)	0	0	0	0	2	3	6	4	15	8	10	2	33	17
D (要医療)	0	0	4	1	3	3	4	8	8	4	1	4	20	20
合計	4	1	35	27	149	210	116	130	159	112	44	20	507	500



頸動脈超音波

【検査結果】

判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	4	1	20	22	63	142	13	48	15	24	1	3	116	240
B (軽度異常)	0	0	10	5	63	51	54	56	68	55	17	9	212	176
C (要観察)	0	0	5	0	22	17	49	26	71	33	25	8	172	84
D (要医療)	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	7	0
合計	4	1	35	27	149	210	116	130	159	112	44	20	507	500



脳ドック


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	7	2	26	20	27	21	49	25	19	9	128	77
精検受診者数	0	0	7	1	17	15	22	19	42	20	17	6	105	61
異常なし	0	0	1	1	2	4	3	3	2	5	3	0	11	13
動脈瘤（5mm以上）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
動脈瘤（5mm未満）	0	0	3	0	1	1	1	3	3	2	1	2	9	8
悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新規脳梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陳旧性脳梗塞	0	0	0	0	3	2	7	7	23	8	9	2	42	19
陳旧性脳出血	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	1	4	4
血管腫	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	4	1
脳萎縮・認知症	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	2	6	3
慢性虚血性変化	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	1	0	4	4
耳鼻領域疾患	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	2	1	8	2
その他の腫瘍様疾患	0	0	0	0	3	2	2	3	1	0	1	0	7	5
その他の主要動脈疾患	0	0	1	0	3	2	3	2	10	4	2	0	19	8
その他の疾患	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	5	1
その他	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

複数回答あり

(男)



(女)



脳ドック

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	
要精検者数	296	289	228	230	205	
精検受診者数	255	255	194	188	166	
精検受診率 (%)	86.1	88.2	85.1	81.7	81.0	
	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率			
異常なし	27 9.47%	29 10.36%	21 9.72%	14 6.60%	24 12.63%	
動脈瘤 (5mm以上)	2 0.70%	3 1.07%	3 1.39%	4 1.89%	1 0.53%	
動脈瘤 (5mm未満)	45 15.79%	74 26.43%	43 19.91%	47 22.17%	17 8.95%	
悪性腫瘍	0 0.00%	1 0.36%	0 0.00%	1 0.47%	0 0.00%	
新規脳梗塞	1 0.35%	1 0.36%	1 0.46%	0 0.00%	0 0.00%	
陳旧性脳梗塞	41 14.39%	53 18.93%	43 19.91%	46 21.70%	61 32.11%	
陳旧性脳出血	4 1.40%	10 3.57%	8 3.70%	8 3.77%	8 4.21%	
血管腫	1 0.35%	3 1.07%	6 2.78%	3 1.42%	5 2.63%	
脳萎縮・認知症	8 2.81%	5 1.79%	6 2.78%	14 6.60%	9 4.74%	
慢性虚血性変化	16 5.61%	9 3.21%	11 5.09%	12 5.66%	8 4.21%	
耳鼻領域疾患	32 11.23%	19 6.79%	13 6.02%	15 7.08%	10 5.26%	
その他の腫瘍様疾患	12 4.21%	17 6.07%	10 4.63%	9 4.25%	12 6.32%	
その他の主要動脈疾患	81 28.42%	40 14.29%	29 13.43%	28 13.21%	27 14.21%	
その他の疾患	6 2.11%	6 2.14%	12 5.56%	7 3.30%	6 3.16%	
その他	9 3.16%	10 3.57%	10 4.63%	4 1.89%	2 1.05%	

脳ドックの総受診者数は1,007人で、MRI検査ではA（異常なし）は79人（7.8%）、B（軽度異常）は625人（62.1%）、C（要観察）は131人（13.0%）、D（要医療）は172人（17.1%）であった。MRA検査ではA（異常なし）は728人（72.2%）、B（軽度異常）は189人（18.8%）、C（要観察）は50人（5.0%）、D（要医療）は40人（4.0%）であった。超音波検査ではA（異常なし）は356人（35.4%）、B（軽度異常）は388人（38.5%）、C（要観察）は256人（25.4%）、D（要医療）は7人（0.7%）であった。平成30年度は悪性腫瘍、新規脳梗塞はなかった。


D（要医療）の205人のうち精検受診者数は166人であり、精検受診率は81.0%であった。

3-1-3 基本健診■

【年代別受診者数】

(人)


性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	743	446	342	311	116	2	1,960
女	660	359	243	169	48	2	1,481
合計	1,403	805	585	480	164	4	3,441



【月別受診者数】

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	322	282	341	308	324	256	308	289	109	286	299	317	3,441




【検査結果】


(人)

判定	A (異常なし)		B (軽度異常)		C (要観察)		D (要医療)		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	1,862	1,363	2	5	64	87	32	26	1,960	1,481
身体計測	984	966	0	0	976	515	0	0	1,960	1,481
視 力	685	483	0	0	538	431	736	566	1,959	1,480
聴 力	1,430	1,344	0	0	84	35	445	101	1,959	1,480
血 圧	1,184	1,143	292	134	305	149	179	55	1,960	1,481
血液一般	991	800	730	358	110	145	128	178	1,959	1,481
肝機能	1,195	1,339	301	76	149	27	314	39	1,959	1,481
脂質代謝	811	837	472	300	510	230	166	114	1,959	1,481
糖代謝	622	840	830	487	388	126	120	28	1,960	1,481
腎機能	1,775	1,412	0	0	160	63	24	6	1,959	1,481
尿一般	1,561	1,054	293	212	69	85	33	127	1,956	1,478
安静心電図	898	982	680	341	263	121	119	37	1,960	1,481
胸部X線	1,425	1,128	427	285	70	26	35	17	1,957	1,456

(男)




(女)



【総合判定】


(人)			
判定	男	女	合計
A (異常なし)	9	26	35
B (軽度異常)	112	83	195
C (要観察)	534	485	1,019
D (要医療)	1,305	887	2,192
合計	1,960	1,481	3,441



【D判定延べ人数】

(人)			
検査項目	男	女	合計
診察	32	26	58
身体計測	—	—	—
視力	736	566	1,302
聴力	445	101	546
血圧	179	55	234
血液一般	128	178	306
肝機能	314	39	353

(人)			
検査項目	男	女	合計
脂質代謝	166	114	280
糖代謝	120	28	148
腎機能	24	6	30
尿一般	33	127	160
心電図	119	37	156
胸部X線	35	17	52



【BMI と腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）：標準

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	984	966	1,950
C1群（要観察）	97	258	355
C2群（要観察）	879	257	1,136
合計	1,960	1,481	3,441




【BMI と腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）】


【A群】

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	77	149	65	93	31	78	9	20	5	3	1	1	188	344
B（軽度異常）	73	58	90	64	84	101	45	57	31	21	8	6	331	307
C（要観察）	35	16	51	19	74	43	67	53	71	54	14	20	312	205
D（要医療）	13	21	17	10	29	12	34	33	38	25	22	9	153	110
合計	198	244	223	186	218	234	155	163	145	103	45	36	984	966

(男)



(女)




【C1群】


(人)

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	16	64	11	41	5	24	0	10	1	0	0	0	33	139
B (軽度異常)	7	16	10	23	6	10	5	8	4	4	0	1	32	62
C (要観察)	2	3	1	4	2	11	5	9	3	11	3	2	16	40
D (要医療)	2	8	0	1	5	3	3	3	4	1	2	1	16	17
合計	27	91	22	69	18	48	13	30	12	16	5	4	97	258

(男) 年齢



(女) 年齢




【C2群】


(人)

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	16	9	19	10	7	7	2	1	3	0	0	0	47	27
B (軽度異常)	44	17	53	11	48	30	27	13	16	7	7	0	195	78
C (要観察)	33	6	74	6	101	30	84	25	81	25	34	6	407	98
D (要医療)	11	3	23	8	54	10	61	11	54	18	27	4	230	54
合計	104	35	169	35	210	77	174	50	154	50	68	10	879	257

(男) 年齢




(女) 年齢



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	（人）		
	男	女	合計
血圧	9	1	10
脂質代謝	9	14	23
糖代謝	2	2	4

C2群	（人）		
	男	女	合計
血圧	100	16	116
脂質代謝	96	24	120
糖代謝	73	20	93



基本健診の受診者数は男性1,960人、女性1,481人で総受診者数は3,441人であった。総合判定別ではA（異常なし）が35人（1.0%）、B（軽度異常）が195人（5.7%）、C（要観察）が1,019人（29.6%）、D（要医療）が2,192人（63.7%）であった。視力・聴力・肝機能の3項目でD（要医療）が多く、視力が1,302人（59.4%）、聴力が546人（24.9%）、肝機能が353人（16.1%）であった。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率

A群（異常なし）は1,950人（56.7%）、C1群（要観察）は355人（10.3%）、C2群（要観察）は1,136人（33.0%）であった。

BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）


A群（異常なし）において、C（要観察）は男性312人、女性205人で合計517人（26.5%）、D（要医療）は男性153人、女性110人で合計263人（13.5%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性16人、女性40人で合計56人（15.8%）、D（要医療）は男性16人、女性17人で合計33人（9.3%）であった。C2群（要観察）においては、C（要観察）は男性407人、女性98人で合計505人（44.5%）、D（要医療）は男性230人、女性54人で合計284人（25.0%）であった。

また、C1群（要観察）とC2群（要観察）において、D（要医療）と判定された人のうち、脂質代謝ではC1群（要観察）の方がC2群（要観察）より割合が高くなっている一方で、血圧と糖代謝ではC2群（要観察）の方がC1群（要観察）より割合が高くなっている。

3-1-4 特定健診■


【年代別受診者数（総合保健医療センター実施分）】

性別	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
男	5	6	9	4	8	21	19	72
女	12	9	7	7	24	32	30	121
合計	17	15	16	11	32	53	49	193



【月別受診者数（総合保健医療センター実施分）】



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	3	7	24	25	18	28	32	56	0	0	0	193



【検査結果（総合保健医療センター実施分）】


(人)

判定	A（異常なし）		B（軽度異常）		C（要観察）		D（要医療）		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	66	109	0	1	4	7	2	4	72	121
身体計測	41	95	0	0	31	26	0	0	72	121
眼底	1	1	0	1	1	2	2	1	4	5
血 圧	30	77	13	18	23	17	6	9	72	121
血液一般	38	78	31	25	1	10	2	8	72	121
肝機能	53	105	10	10	3	2	6	4	72	121
脂質代謝	17	39	23	26	27	36	5	20	72	121
糖代謝	16	27	37	66	13	23	6	5	72	121
腎機能	57	98	0	0	12	21	3	2	72	121
尿一般	54	81	7	25	8	10	2	5	71	121
安静心電図	37	72	21	23	8	19	6	7	72	121

(男)
人人
(女)

総合判定（総合保健医療センター実施分）


判定	(人)		
	男	女	合計
A（異常なし）	0	4	4
B（軽度異常）	7	17	24
C（要観察）	38	49	87
D（要医療）	27	51	78
合計	72	121	193



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	2	4	6
身体計測	—	—	—
眼底	2	1	3
血圧	6	9	15
血液一般	2	8	10
肝機能	6	4	10

検査項目	(人)		
	男	女	合計
脂質代謝	5	20	25
糖代謝	6	5	11
腎機能	3	2	5
尿一般	2	5	7
心電図	6	7	13



【BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	41	95	136
C1群（要観察）	3	8	11
C2群（要観察）	28	18	46
合計	72	121	193




【BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）】


【A群】

生活習慣病判定	(人)									
	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	0	3	0	4	0	1	0	2	0	10
B（軽度異常）	3	10	4	1	5	13	0	4	12	28
C（要観察）	2	2	3	3	10	18	7	9	22	32
D（要医療）	0	0	0	1	3	15	4	9	7	25
合計	5	15	7	9	18	47	11	24	41	95

(男)




(女)




【C1群】

生活習慣病判定	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	A (異常なし)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (軽度異常)	1	2	0	2	2	1	0	0	3	5
C (要観察)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D (要医療)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
合計	1	2	0	2	2	2	0	2	3	8

(男) 年齢




(女) 年齢




【C2群】

生活習慣病判定	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	A (異常なし)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B (軽度異常)	1	2	2	0	0	0	0	1	3	3
C (要観察)	2	2	2	3	5	4	5	3	14	12
D (要医療)	2	0	1	0	4	3	3	0	10	3
合計	5	4	6	3	9	7	8	4	28	18

(男)




(女)



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	（人）		
	男	女	合計
血圧	0	1	1
脂質代謝	0	2	2
糖代謝	0	0	0

C2群	（人）		
	男	女	合計
血圧	3	1	4
脂質代謝	2	2	4
糖代謝	5	1	6



特定健診（総合保健医療センター実施分）の受診者数は男性72人、女性121人で総受診者数は193人であり、総合判定別ではA（異常なし）が4人（2.1%）、B（軽度異常）が24人（12.4%）、C（要観察）が87人（45.1%）、D（要医療）が78人（40.4%）であった。脂質代謝・血圧・心電図の3項目でD（要医療）が多く、脂質代謝が25人（32.1%）で、血圧が15人（19.2%）、心電図が13人（16.7%）であった。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率


A群（異常なし）は136人（70.5%）、C1群（要観察）は11人（5.7%）、C2群（要観察）は46人（23.8%）であった。

BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性22人、女性32人で合計54人（39.7%）、D（要医療）は男性7人、女性25人で合計32人（23.5%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性女性ともに0人（0%）、D（要医療）は男性0人、女性3人で合計3人（27.3%）であった。C2群（要観察）において、C（要観察）は男性14人、女性12人で合計26人（56.5%）、D（要医療）は男性10人、女性3人で合計13人（28.3%）であった。


【年代別受診者数（保健センター実施分）】

性別	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
男	5	9	3	1	1	49	54	122
女	5	9	7	12	15	92	66	206
合計	10	18	10	13	16	141	120	328



【月別受診者数（保健センター実施分）】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	0	0	75	0	58	44	102	49	0	0	0	328




【検査結果（保健センター実施分）】


(人)

判定	A（異常なし）		B（軽度異常）		C（要観察）		D（要医療）		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	診 察	113	197	0	0	1	5	8	4	122
身体計測	53	137	0	0	69	69	0	0	122	206
眼底	3	2	0	0	1	0	4	3	8	5
血 圧	45	105	35	39	28	28	14	27	122	199
血液一般	54	77	49	109	16	12	3	8	122	206
肝機能	87	179	18	15	5	7	12	5	122	206
脂質代謝	38	52	43	56	29	74	12	24	122	206
糖代謝	47	113	38	68	29	20	8	5	122	206
腎機能	82	147	0	0	35	57	5	2	122	206
尿一般	105	171	3	8	10	12	4	15	122	206
安静心電図	64	123	24	42	21	33	13	8	122	206

(男)




人
(女)



総合判定（保健センター実施分）


判定	(人)		
	男	女	合計
A（異常なし）	2	1	3
B（軽度異常）	4	24	28
C（要観察）	53	104	157
D（要医療）	63	77	140
合計	122	206	328



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	8	4	12
身体計測	—	—	—
眼底	4	3	7
血圧	14	27	41
血液一般	3	8	11
肝機能	12	5	17

検査項目	(人)		
	男	女	合計
脂質代謝	12	24	36
糖代謝	8	5	13
腎機能	5	2	7
尿一般	4	15	19
心電図	13	8	21



【BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）：標準

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	53	137	190
C1群（要観察）	5	27	32
C2群（要観察）	64	42	106
合計	122	206	328




【BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）】


【A群】

生活習慣病判定	(人)									
	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	3	3	1	3	1	5	2	0	7	11
B（軽度異常）	0	5	1	5	6	28	8	10	15	48
C（要観察）	4	0	0	5	6	25	5	14	15	44
D（要医療）	2	1	0	2	4	15	10	16	16	34
合計	9	9	2	15	17	73	25	40	53	137

(男)




(女)




【C1群】

生活習慣病判定	(人)									
	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3
B (軽度異常)	0	1	0	0	0	5	1	3	1	9
C (要観察)	0	0	0	1	1	6	2	4	3	11
D (要医療)	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4
合計	0	1	0	1	1	15	4	10	5	27



【C2群】


生活習慣病判定	(人)									
	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
B (軽度異常)	2	0	0	1	9	0	5	1	16	2
C (要観察)	0	2	2	1	19	9	13	13	34	25
D (要医療)	3	2	0	1	4	8	7	2	14	13
合計	5	4	2	3	32	19	25	16	64	42



【生活習慣病判定(D判定)におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	3	3
脂質代謝	0	1	1
糖代謝	0	1	1

C2群	(人)		
	男	女	合計
血圧	7	9	16
脂質代謝	5	2	7
糖代謝	3	2	5



特定健診（保健センター実施分）の受診者数は男性122人、女性206人で総受診者数は328人であり、総合判定別ではA（異常なし）が3人（0.9%）、B（軽度異常）が28人（8.5%）、C（要観察）が157人（47.9%）、D（要医療）が140人（42.7%）であった。血圧・脂質代謝・心電図の3項目でD（要医療）が多く、血圧が41人（29.3%）、脂質代謝が36人（25.7%）、心電図が21人（15.0%）であった。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率

A群（異常なし）は190人（57.9%）、C1群（要観察）は32人（9.8%）、C2群（要観察）は106人（32.3%）であった。

BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）


A群（異常なし）において、C（要観察）は男性15人、女性44人で合計59人（31.1%）、D（要医療）は男性16人、女性34人で合計50人（26.3%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性3人、女性11人で合計14人（43.8%）、D（要医療）は男性0人、女性4人合計4人（12.5%）であった。C2群（要観察）において、C（要観察）は男性34人、女性25人で合計59人（55.7%）、D（要医療）は男性14人、女性13人で合計27人（25.5%）であった。

また、C1群（要観察）とC2群（要観察）において、D（要医療）と判定された人のうち、血圧ではC1群（要観察）の方がC2群（要観察）より割合が高くなっている一方で、脂質代謝と糖代謝ではC2群（要観察）の方がC1群（要観察）より割合が高くなっている。

3-1-5 生活習慣病予防健診■


【年代別受診者数】

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	0	0	0	0	0	0	0
女	0	3	2	6	0	0	11
合計	0	3	2	6	0	0	11



【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	1	1	0	0	2	1	2	0	3	1	0	0	11




【検査結果】

(人)

判定	A (異常なし)		B (軽度異常)		C (要観察)		D (要医療)		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	0	10	0	0	0	0	0	1	0	11
身体計測	0	9	0	0	0	2	0	0	0	11
血 圧	0	8	0	0	0	3	0	0	0	11
血液一般	0	9	0	1	0	1	0	0	0	11
肝機能	0	10	0	1	0	0	0	0	0	11
脂質代謝	0	7	0	2	0	2	0	0	0	11
糖代謝	0	6	0	2	0	3	0	0	0	11
腎機能	0	10	0	0	0	1	0	0	0	11
尿一般	0	10	0	0	0	0	0	1	0	11
安静心電図	0	7	0	1	0	3	0	0	0	11

(女)




3-1-6 ヤング健診■

【月別受診者数（総合保健医療センター実施分）】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	6	61	15	29	44	37	32	38	59	17	22	35	395



【月別受診者数（保健センター実施分）】

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	0	37	20	34	13	0	0	0	34	22	0	160




【検査結果（総合保健医療センター実施分）】


(人)

判定	A（異常なし）		B（軽度異常）		C（要観察）		D（要医療）		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	65	300	0	1	2	20	2	5	69	326
身体計測	39	216	0	0	30	110	0	0	69	326
血 圧	64	309	2	12	2	4	1	1	69	326
血液一般	47	196	17	64	3	33	2	33	69	326
肝機能	45	308	6	7	4	5	14	6	69	326
脂質代謝	35	222	17	49	12	33	5	22	69	326
糖代謝	37	231	25	89	6	6	1	0	69	326
腎機能	69	325	0	0	0	1	0	0	69	326
尿一般	54	225	12	46	3	16	0	38	69	325
安静心電図	28	225	30	81	10	17	1	3	69	326

(男)



(女)




【検査結果（保健センター実施分）】


(人)

判定	A（異常なし）		B（軽度異常）		C（要観察）		D（要医療）		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	32	122	0	0	0	1	0	5	32	128
身体計測	18	87	0	0	14	41	0	0	32	128
血 圧	29	124	2	3	1	1	0	0	32	128
血液一般	19	33	12	74	1	10	0	11	32	128
肝機能	26	122	4	3	1	1	1	2	32	128
脂質代謝	18	95	4	15	7	9	3	9	32	128
糖代謝	29	123	2	4	1	1	0	0	32	128
腎機能	32	127	0	0	0	1	0	0	32	128
尿一般	32	111	0	0	0	5	0	12	32	128
安静心電図	22	84	8	34	2	9	0	1	32	128

(男)




(女)



総合判定（総合保健医療センター実施分）


(人)			
判定	男	女	合計
A（異常なし）	3	31	34
B（軽度異常）	14	66	80
C（要観察）	32	132	164
D（要医療）	20	97	117
合計	69	326	395



【D判定延べ人数】

(人)			
検査項目	男	女	合計
診察	2	5	7
身体計測	—	—	—
血圧	1	1	2
血液一般	2	33	35
肝機能	14	6	20

(人)			
検査項目	男	女	合計
脂質代謝	5	22	27
糖代謝	1	0	1
腎機能	0	0	0
尿一般	0	38	38
心電図	1	3	4



【BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）


(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	39	216	255
C1群（要観察）	6	80	86
C2群（要観察）	24	30	54
合計	69	326	395




【BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）】

生活習慣病判定	A群		C1群		C2群		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	14	114	3	45	7	4	24	163
B（軽度異常）	14	67	3	25	6	11	23	103
C（要観察）	9	21	0	6	7	10	16	37
D（要医療）	2	14	0	4	4	5	6	23
合計	39	216	6	80	24	30	69	326

(男)




(女)



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	0	0
脂質代謝	0	4	4
糖代謝	0	0	0

C2群	(人)		
	男	女	合計
血圧	1	1	2
脂質代謝	3	4	7
糖代謝	1	0	1



ヤング健診（総合保健医療センター実施分）の受診者数は男性69人、女性326人で総受診者数は395人であり、総合判定別ではA（異常なし）が34人（8.6%）、B（軽度異常）が80人（20.3%）、C（要観察）が164人（41.5%）、D（要医療）が117人（29.6%）であった。尿一般・血液一般・脂質代謝の3項目でD（要医療）が多く、尿一般が38人（32.5%）、血液一般が35人（29.9%）、脂質代謝が27人（23.1%）であった。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定比率

A群（異常なし）は255人（64.5%）、C1群（要観察）は、86人（21.8%）、C2群（要観察）は54人（13.7%）であった。


BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性9人、女性21人で合計30人（11.8%）、D（要医療）は男性2人、女性14人で合計16人（6.3%）、C1群（要観察）において、C（要観察）は男性0人、女性6人で合計6人（7.0%）、D（要医療）は男性0人、女性4人で合計4人（4.7%）、C2群（要観察）において、C（要観察）は男性7人、女性10人で合計17人（31.5%）、D（要医療）は男性4人、女性5人で合計9人（16.7%）であった。

また、C1群（要観察）とC2群（要観察）においてD（要医療）と判定された人のうち、脂質代謝ではC1群（要観察）の方がC2群（要観察）より割合が高くなっている一方で、血圧と糖代謝ではC2群（要観察）の方がC1群（要観察）より割合が高くなっている。

総合判定（保健センター実施分）


判定	(人)		
	男	女	合計
A（異常なし）	7	9	16
B（軽度異常）	3	40	43
C（要観察）	18	43	61
D（要医療）	4	36	40
合計	32	128	160



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	0	5	5
身体計測	—	—	—
血圧	0	0	0
血液一般	0	11	11
肝機能	1	2	3

検査項目	(人)		
	男	女	合計
脂質代謝	3	9	12
糖代謝	0	0	0
腎機能	0	0	0
尿一般	0	12	12
心電図	0	1	1



【BMI と腹囲による（痩せ・肥満）判定比率】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）


(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	18	87	105
C1群（要観察）	1	34	35
C2群（要観察）	13	7	20
合計	32	128	160




【BMI と腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）】

生活習慣病判定	(人)							
	A群		C1群		C2群		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	12	60	1	27	5	2	18	89
B（軽度異常）	0	14	0	2	3	4	3	20
C（要観察）	5	6	0	3	3	1	8	10
D（要医療）	1	7	0	2	2	0	3	9
合計	18	87	1	34	13	7	32	128

(男)




(女)



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	0	0
脂質代謝	0	2	2
糖代謝	0	0	0

C2群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	0	0
脂質代謝	2	0	2
糖代謝	0	0	0



ヤング健診（保健センター実施分）の受診者数は男性32人、女性128人で総受診者数は160人であり、総合判定別ではA（異常なし）が16人（9.0%）、B（軽度異常）が43人（22.2%）、C（要観察）が61人（40.5%）、D（要医療）が40人（28.3%）であった。脂質代謝・尿一般・血液一般の3項目でD（要医療）が多く、脂質代謝と尿一般がそれぞれ12人（30.0%）、血液一般が11人（27.5%）であった。

BMIと腹囲による（痩せ・肥満）判定による男女の比率

A群（異常なし）は105人（65.6%）、C1群（要観察）は35人（21.9%）、C2群（要観察）は20人（12.5%）であった。

BMIと腹囲からみた生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝の3項目に対する判定）


A群（異常なし）においてC（要観察）は男性5人、女性6人で合計11人（10.5%）、D（要医療）は男性1人、女性7人で合計8人（7.6%）、C1群（要観察）においてC（要観察）は男性0人、女性3人で合計3人（8.6%）、D（要医療）は男性0人、女性2人で合計2人（5.7%）、C2群（要観察）においてC（要観察）は男性3人、女性1人で合計4人（20.0%）、D（要医療）は男性2人、女性0人で合計2人（10.0%）であった。

また、C1群（要観察）とC2群（要観察）においてD（要医療）と判定されたのは、脂質代謝の人のみであった。

3-1-7 骨密度検査■


【年代別受診者数】

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	1	121	121	487	1,091	331	2,152
女	4	230	231	907	1,056	147	2,575
合計	5	351	352	1,394	2,147	478	4,727





【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	372	430	417	440	359	347	462	430	403	343	348	376	4,727



【検査結果】


判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	0	3	70	175	73	130	280	260	552	208	129	8	1,104	784
要指導	1	1	44	52	44	76	166	461	420	556	128	78	803	1,224
要精検	0	0	7	3	4	25	41	186	119	292	74	61	245	567
合計	1	4	121	230	121	231	487	907	1,091	1,056	331	147	2,152	2,575



3-1-8 乳がん検査■


【年代別受診者数】

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	320	740	430	757	477	25	2,749





【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	158	233	215	252	227	209	307	252	232	217	245	202	2,749



年度別精密検査分析



年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
						異常なし	がん	がん以外		
26	1,566	116	7.41	107	92.24	34	6	67	0.38	5.17
27	1,970	162	8.22	149	91.98	83	7	59	0.36	4.32
28	2,738	175	6.39	154	88.00	70	11	73	0.40	6.29
29	2,734	173	6.33	157	90.75	61	5	91	0.18	2.89
30	2,749	132	4.80	120	90.91	48	11	61	0.40	8.33



【検査結果】

(人)


判定	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
異常なし	260	573	347	655	416	22	2,273
精検不要	36	112	65	81	47	3	344
要精検	24	55	18	21	14	0	132
合計	320	740	430	757	477	25	2,749



【所見】

(人)

所見	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
異常なし	260	573	347	655	416	22	2,273
石灰化	38	100	47	69	37	1	292
腫瘤	11	30	19	20	14	2	96
局所的非対称性陰影	10	21	9	9	4	0	53
構築の乱れ	1	6	4	7	7	0	25
その他	0	0	4	9	10	0	23




【精密検査結果】

(件)

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
要精検者数	24	55	18	21	14	0	132
精検受診者数	22	49	17	18	14	0	120
異常なし	10	19	7	8	4	0	48
乳がん	0	3	1	3	4	0	11
線維腺腫	2	11	1	3	2	0	19
乳腺症	5	15	2	2	1	0	25
乳管内乳頭腫	1	0	0	0	0	0	1
その他	8	8	6	2	4	0	28

複数回答あり



乳がん検査

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
要精検者数	116	162	175	173	132
精検受診者数	107	149	154	157	120
精検受診率 (%)	92.2	92.0	88.0	90.8	90.9

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率		(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率
異常なし	34	83	70	61	48
	28.81%	43.23%	42.42%	35.06%	36.36%
乳がん	6	7	11	5	11
	5.08%	3.65%	6.67%	2.87%	8.33%
線維腺腫	19	20	26	32	19
	16.10%	10.42%	15.76%	18.39%	14.39%
乳腺症	28	23	25	37	25
	23.73%	11.98%	15.15%	21.26%	18.94%
乳管内乳頭腫	2	2	0	0	1
	1.69%	1.04%	0.00%	0.00%	0.76%
その他	29	57	33	39	28
	24.58%	29.69%	20.00%	22.41%	21.21%

乳がん検査の総受診者数は2,749人で、「異常なし」は2,273人(82.7%)、「精検不要」は344人(12.5%)、「要精検」は132人(4.8%)であった。


「要精検」のうち精検受診者数は120人であり、精検受診率は90.9%であった。

また、がん発見率は0.40%、陽性反応的中度は8.33%であった。

【年代別受診者数(医師会依頼による乳房X線撮影)】

(人)


年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	42	119	111	101	114	19	506



【月別受診者数(医師会依頼による乳房X線撮影)】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	10	40	45	37	38	52	78	73	41	40	40	12	506



3-1-9 子宮がん検査■


【年代別受診者数】

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	290	556	307	621	383	20	2,177





【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	156	207	169	196	182	157	223	184	176	173	183	171	2,177



年度別精密検査分析



年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
						異常なし	がん	がん以外		
26	1,566	1	0.06	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
27	1,970	1	0.05	1	100.00	0	0	1	0.00	0.00
28	2,738	5	0.18	2	40.00	1	0	1	0.00	0.00
29	2,734	19	0.69	16	84.21	6	2	8	0.07	10.53
30	2,177	30	1.38	21	70.00	7	3	11	0.14	10.00



【検査結果】

(人)

判定	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
異常なし	282	545	300	619	381	20	2,147
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0
要精検	8	11	7	2	2	0	30
合計	290	556	307	621	383	20	2,177




【精密検査結果】

(件)

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
要精検者数	8	11	7	2	2	0	30
精検受診者数	5	8	6	1	1	0	21
異常なし	3	2	1	0	1	0	7
子宮頸がん	0	2	1	0	0	0	3
子宮体がん	0	0	0	0	0	0	0
上皮内腫瘍	1	2	4	1	0	0	8
異形成	0	2	0	0	0	0	2
その他のがん	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患	1	0	0	0	0	0	1

複数回答あり



子宮がん検査

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	
要精検者数	1	1	5	19	30	
精検受診者数	0	1	2	16	21	
精検受診率 (%)	0.0	100.0	40.0	84.2	70.0	

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	0	0	1	6	7
	0.00%	0.00%	50.00%	37.50%	33.33%
子宮頸がん	0	0	0	2	3
	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	14.29%
子宮体がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
上皮内腫瘍	0	0	0	5	8
	0.00%	0.00%	0.00%	31.25%	38.10%
異形成	0	1	0	0	2
	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	9.52%
その他のがん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
その他の疾患	0	0	1	3	1
	0.00%	0.00%	50.00%	18.75%	4.76%

子宮がん検査の総受診者数は2,177人で、「異常なし」は2,147人(98.6%)、「その他の疾患」は0人(0%)、「要精検」は30人(1.4%)であった。

「要精検」のうち精検受診者数は21人であり、精検受診率は70.0%であった。

また、がん発見率は0.14%、陽性反応的中度は10.0%であった。


なお、がん発見率、陽性反応的中度が向上したのは、平成29年4月から細胞採取器具を綿棒からサーベックスブラシに変更したことが要因の一つと考えられる。

3-1-10 指導実施状況■

【医師による指導実施者数】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人間ドック	39	40	49	47	35	26	43	61	30	21	31	28	450
脳ドック	32	28	24	32	21	29	28	32	28	14	17	16	301
乳がん検査	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4
子宮がん検査	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3
ヤング健診	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9
ヤング健診 (保健センター実施分)	0	—	—	0	0	0	—	0	—	—	—	1	1
合計	72	70	75	80	56	55	74	93	59	37	49	48	768



【保健師、管理栄養士による個別保健指導実施者数】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人間ドック	406	411	469	485	404	438	532	564	432	401	412	452	5,406
ヤング健診	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9
合計	407	412	471	485	404	438	533	564	432	401	413	455	5,415



【特定保健指導実施者数の推移】

(人)


年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
動機付け支援	646	711	500	519	563
積極的支援	293	355	248	263	270
合計	939	1,066	748	782	833



【人間ドック受診者への保健指導数の推移】

(人)


年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
保健指導者数	2,650	2,886	3,328	4,978	5,406
受診者数	8,200	8,781	9,566	9,625	9,631
合計	10,850	11,667	12,894	14,603	15,037



【特定保健指導終了者数の推移】

(%) (人)

年度	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年
特定保健指導終了者	121	363	267	266	299
特定保健指導対象者	626	517	565	535	552
特定保健指導実施率*4	19.3	70.2	47.3	49.7	54.2
実施率目標値（春日井市）	25	30	35	40	45



平成26年6月に総合保健医療センターの開所と同時に、健診受診者のうち、特定健診対象者に対し特定保健指導の初回面接を開始しており、結果、当センターでの特定保健指導実施率は、平成27年度以降、春日井市の定める実施率の目標値を上回っている。


また、厚生労働省の統計によると、40歳から74歳のすべての被保険者及び被扶養者を対象とする特定保健指導実施率は、平成27年度は17.5%、平成28年度は18.8%、平成29年度は19.5%と推移している。保険者種類別の実施率でも平成29年度は、市町村国保が25.6%、共済組合が25.5%、健保組合が21.4%である。

一方で、当センターでの実施率は、平成29年度は49.7%、平成30年度は54.2%であり、上記のいずれの数値も上回っている。

*4 特定保健指導実施率とは、「当該年度の動機付け支援・積極的支援の終了者」の数を、「当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援・積極的支援の対象とされた者」の数で除した割合

【特定保健指導実施者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	47	34	47	47	48	52	57	39	51	53	46	42	563
積極的支援	20	27	21	18	26	25	22	23	12	28	24	24	270
合計	67	61	68	65	74	77	79	62	63	81	70	66	833




【人間ドック受診者の特定保健指導対象者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	25	25	37	32	47	22	36	31	45	38	33	26	397
積極的支援	9	14	7	13	18	10	15	15	7	19	10	18	155
合計	34	39	44	45	65	32	51	46	52	57	43	44	552


【初回面接実施者数 (保健センター実施分含む)】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	16	17	20	24	27	17	33	24	38	30	23	20	289
積極的支援	7	8	4	8	13	5	10	10	4	16	9	13	107
合計	23	25	24	32	40	22	43	34	42	46	32	33	396


特定保健指導対象者数



初回面接実施者数 (保健センター実施分含む)



人間ドック受診者の内訳
人間ドック受診者 9,631人



■ 春日井市国保以外 ■ 春日井市国保加入者 ■ 後期高齢者

春日井市国保加入者のうち、
特定保健指導対象者の内訳
(他施設健診受診者も含む)
特定保健指導対象者 564人



■ 動機付け支援 ■ 積極的支援

【特定保健指導実施者数（保健センター実施分）】

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	1	2	0	0	2	3	2	1	4	3	0	4	22
積極的支援	0	0	1	0	1	2	2	1	1	1	2	4	15
合計	1	2	1	0	3	5	4	2	5	4	2	8	37

