

健診事業

3-1 健診事業

(1) 目的

疾病の早期発見及び疾病予防に対する意識の向上を図る。

(2) 健診の状況

健診名称		内 容	実施回数	受診者数 (回・人)
人間ドック		生活習慣病等を総合的に検査する健診		7,395
オープン シヨン 検査	内臓脂肪測定	インピーダンス法測定による検査		1,158
	動脈硬化検査	血圧脈波による検査		2,248
	甲状腺検査	甲状腺機能ホルモンなどの検査		1,085
	BNP検査	心臓への負担の程度の検査		1,336
	胸部断層X線撮影	複数の角度から肺を撮影する検査		1,056
	喀痰検査	喀痰細胞診検査		1,184
	胃がんリスク検査	ペプシノゲン検査とヘリコバクター・ピロリ抗体検査	212	1,078
	前立腺がん検査	PSA値の検査		2,866
	腫瘍マーカー検査	主に肝臓、大腸、膵臓がんの検査		2,119
	女性腫瘍マーカー検査	主に卵巣がんの検査		905
骨密度検査(人間ドック受診時)		超音波測定による検査		3,945
特定健診・後期高齢者健診(人間ドック受診時)		人間ドック受診者のうち市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者を対象としたメタボリック健診		5,143
脳ドック		MR I・MRA・頸動脈超音波検査など	212	1,002
骨密度検査		骨密度検査のみを希望する者に月1回実施	11	68
乳がん検査		乳房X線撮影	97	2,094
		医師会依頼による乳房X線撮影	45	437
子宮がん検査		内診と子宮頸部細胞診	97	1,547
基本健診		労働安全衛生法に基づく健康診断と同等の健診	210	3,002
生活習慣病予防健診		職域などで健診を受診する機会の少ない人を対象とした特定健診と同等の健診	5	5

健診名称	内 容	(回・人)	
		実施回数	受診者数
ヤング健診	受診機会の少ない40歳未満を対象とした特定健診と同等の健診	111	211
ヤング健診 (保健センター実施分)		5	83
特定健診	市国民健康保険加入者を対象としたメタボリック健診	62	191
特定健診 (保健センター実施分)		5	229
計		1,072	40,387

表中、特に記載がないものは総合保健医療センターで実施

(3) 健診料金等

健診名称		対象者	料 金
人間ドック		40歳の市民	4,000
		41歳以上の市民で市国民健康保険被保険者 または後期高齢者医療被保険者	7,000
		41歳以上の市民	17,000
		上記以外の人	31,000
オ プ シ ヨ ン 検 査	内臓脂肪測定	40歳以上の市民	1,000
		上記以外の人	2,000
	動脈硬化検査	40歳以上の市民	600
		上記以外の人	1,300
	甲状腺検査	40歳以上の市民	1,900
		上記以外の人	3,900
	BNP検査	40歳以上の市民	700
		上記以外の人	1,400
	胸部断層X線撮影	40歳以上の市民	2,100
		上記以外の人	4,200
	喀痰検査	40歳以上の市民	900
		上記以外の人	1,900
	胃がんリスク検査	40歳以上の市民	2,400
		うち、40・45・50・55・60・65・70・75歳の市民	1,400
		上記以外の人	4,800
	前立腺がん検査	50歳以上の男性市民	★600
上記以外の男性		2,300	
腫瘍マーカー検査	40歳以上の市民	1,800	
	上記以外の人	3,600	
女性腫瘍マーカー検査	40歳以上の女性市民	800	
	上記以外の女性	1,600	

		(円)	
健診名称	対象者	料 金	
脳ドック	50歳の市民	10,000	
	うち、人間ドック受診後3か月以内に受診する人	7,000	
	上記以外の市民	34,000	
	うち、人間ドック受診後3か月以内に受診する人	24,000	
基本健診	市民または、市内に事業所を有する事業主及びその従業者	4,500	
	上記以外の人	9,000	
生活習慣病予防健診	40歳以上の市民で市国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者を除く	3,000	
	上記以外の人	6,000	
ヤング健診	18歳以上39歳以下の市民	500	
特定健診	40歳以上の市国民健康保険被保険者	無料	
骨密度検査	18歳以上の女性市民または30歳以上の男性市民	★600	
	人間ドックの受診者で上記以外の人	2,900	
子宮がん検査	20歳以上の女性市民	★1,300	
	人間ドックの受診者で上記以外の女性	5,000	
乳がん検査	30歳以上の女性市民	★1,700	
	人間ドックの受診者で上記以外の女性	3,000	

表中の年齢は、当該年度中（4月～翌年3月）に迎える誕生日での年齢
次の人は★印の受診料金が免除

- ・70歳以上の人
- ・市国民健康保険被保険者
- ・後期高齢者医療被保険者
- ・生活保護などの被保護世帯等の人
- ・世帯全員が市民税非課税の人

(4) 健診別検査項目一覧表

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
健康調査・医療面接		●	●	●	●	●	●
MR I			●				
MR A			●				
頸動脈超音波			●				
診察		●	■	●	●	●	●
身体計測	身長	●	●	●	●	●	●
	体重	●	●	●	●	●	●
	標準体重	●	●	●	●	●	●
	腹囲	●	●	●	●	●	●
	肥満度	●	●	●	●	●	●

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
	BMI	●	●	●	●	●	●
	体脂肪率	●	●				
視力		●		●			
眼圧		●					
眼底	動脈硬化性変化	●	■		▲	▲	
	高血圧性変化	●	■		▲	▲	
	K-W	●	■		▲	▲	
	糖尿病性変化	●	■		▲	▲	
聴力	1000Hz	●		●			
	4000Hz	●		●			
血圧	最高(収縮期)	●	■	●	●	●	●
	最低(拡張期)	●	■	●	●	●	●
血液一般	白血球数	●	■	●	●	●	●
	赤血球数	●	■	●	●	●	●
	血色素量	●	■	●	●	●	●
	ヘマトクリット	●	■	●	●	●	●
	血小板数	●	■	●	●	●	●
	MCV	●	■	●	●	●	●
	MCH	●	■	●	●	●	●
	MCHC	●	■	●	●	●	●
	白血球分画	●	■				
血清鉄	●	■					
肝機能	総蛋白	●	■				
	アルブミン	●	■				
	A/G比	●	■				
	総ビリルビン	●	■				
	AST(GOT)	●	■	●	●	●	●
	ALT(GPT)	●	■	●	●	●	●
	γ-GT	●	■	●	●	●	●
	ALP	●	■				
	LD	●	■				
コリンエステラーゼ	●	■					
膵機能	アミラーゼ	●	■				
心筋・筋疾患	CK	●	■				
脂質代謝	総コレステロール	●	■				
	HDLコレステロール	●	■	●	●	●	●
	LDLコレステロール	●	■	●	●	●	●
	中性脂肪	●	■	●	●	●	●
糖代謝	空腹時血糖	●	■	●	●	●	●
	HbA1c	●	■	●	●	●	●

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
	尿糖	●	■	●	●	●	●
腎機能	尿素窒素	●	■				
	クレアチニン	●	■	●	●	●	●
	シスタチンC	●	■				
	eGFR creat	●	■	●	●	●	●
	尿アルブミン/Cr比	●					
尿一般	尿蛋白	●	■	●	●	●	●
	尿潜血	●	■	●	●	●	●
	ウロビリノーゲン	●	■				
	ケトン体	●	■				
	ビリルビン	●	■				
	pH	●	■				
	尿比重	●	■				
	亜硝酸塩	●	■				
	白血球	●	■				
尿沈渣	●	■					
痛風	尿酸	●	■				
免疫反応	CRP	●					
	RF	●					
感染症	HBs抗原	●					
	HCV抗体	●					
	脂質抗体	●					
	TP抗体	●					
便潜血	2日法	●					
肺機能	肺活量	●					
	%肺活量	●					
	努力性肺活量	●					
	努力性肺活量率	●					
	%1秒量	●					
	1秒率	●					
安静心電図	12誘導	●	■	●	●	●	●
	心拍数	●	■	●	●	●	●
胸部X線	正面	●	■	●			
	側面	●					
	心胸郭比	●	■	●			
胃部X線	上部消化管	●					
腹部超音波		●					
血液型	ABO	●	■				
	Rh	●	■				
内臓脂肪	内臓脂肪面積	△					

検査項目		人間 ドック	脳 ドック	基本 健診	特定 健診	生活習 慣病予 防健診	ヤング 健診
動脈硬化	ABI	△					
	baPWV	△					
甲状腺	TSH	△					
	FT3	△					
	FT4	△					
BNP		△					
胸部断層X線		△					
喀痰細胞診		△					
胃がんリスク	ピロリ菌抗体価	△					
	ペプシノゲンI	△					
	ペプシノゲンII	△					
	PGI/II	△					
前立腺がん	PSA	△					
腫瘍マーカー	AFP	△					
	CEA	△					
	CA19-9	△					
女性腫瘍マーカー	CA125	△					
骨密度	踵骨超音波	□					
認知症簡易検査		☆					
乳がん検査	マンモグラフィ	○		○	○	○	○
子宮がん検査	頸部細胞診	○		○	○	○	○

□：人間ドックと同時に検査可能、骨密度：第2火曜日午後実施

■：脳ドックの検査項目について、3か月以内に人間ドックを受診している場合、重複する項目は省略

△：オプション設定

▲：前年度の健診結果により対象者が決定

○：水曜日のみ同時に検査可能


乳がん検査：火曜日午後、水曜日午後実施

子宮がん検査：火曜日午後実施


☆：75歳以上の市民で希望する者

3-1-1 人間ドック ■

性別	～39歳	40歳	41～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	39	151	404	415	686	1,540	567	3,802
女	26	295	424	471	892	1,263	222	3,593
合計	65	446	828	886	1,578	2,803	789	7,395
構成比	0.88%	6.03%	11.20%	11.98%	21.34%	37.90%	10.67%	100.00%



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	249	-	730	816	656	750	837	696	672	575	623	791	7,395



*1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため5月は乳がん検査、子宮がん検査を除く健診事業を休止。
令和2年度の休止期間は166ページ参照。

診察

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	38	534	399	632	1,404	479	3,486
	女	24	676	440	832	1,171	184	3,327
B (軽度異常)	男	1	10	9	19	24	12	75
	女	1	19	13	26	22	10	91
C (要観察)	男	0	6	3	12	39	28	88
	女	1	16	9	23	42	13	104
D (要医療)	男	0	5	4	23	73	48	153
	女	0	8	9	11	28	15	71
合計	男	39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女	26	719	471	892	1,263	222	3,593

身体計測




(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	29	264	194	335	794	299	1,915
	女	17	518	345	630	875	138	2,523
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	10	291	221	351	746	268	1,887
	女	9	201	126	262	388	84	1,070
D (要医療)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
合計	男	39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女	26	719	471	892	1,263	222	3,593

視力

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	20	228	162	184	216	41	851
	女	12	286	144	218	145	15	820
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	10	138	111	218	489	120	1,086
	女	8	207	135	285	361	44	1,040
D (要医療)	男	9	188	142	280	821	400	1,840
	女	6	224	188	376	740	160	1,694
合計	男	39	554	415	682	1,526	561	3,777
	女	26	717	467	879	1,246	219	3,554



聴力




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		39	492	302	343	410	54	1,640
	女		25	695	428	651	636	57	2,492
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	15	29	63	128	34	269
	女		0	4	15	79	120	21	239
D (要医療)	男		0	48	84	277	983	452	1,844
	女		1	19	26	158	494	136	834
合計	男		39	555	415	683	1,521	540	3,753
	女		26	718	469	888	1,250	214	3,565

血圧

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		32	351	206	243	363	97	1,292
	女		25	586	277	364	316	39	1,607
B (軽度異常)	男		3	102	98	164	346	118	831
	女		1	66	84	189	243	41	624
C (要観察)	男		2	82	81	208	581	245	1,199
	女		0	54	81	242	480	86	943
D (要医療)	男		2	20	30	71	250	107	480
	女		0	13	29	97	224	56	419
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

血液一般

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		12	142	84	112	243	69	662
	女		8	127	131	260	350	42	918
B (軽度異常)	男		26	391	303	506	1,062	345	2,633
	女		15	402	274	528	753	129	2,101
C (要観察)	男		0	9	13	32	141	95	290
	女		2	92	27	47	90	33	291
D (要医療)	男		1	13	15	36	94	58	217
	女		1	98	39	57	70	18	283
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593



肝機能




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		22	258	203	391	961	338	2,173
	女		17	556	351	661	900	147	2,632
B (軽度異常)	男		6	99	62	110	219	65	561
	女		4	60	32	61	97	7	261
C (要観察)	男		5	92	80	106	238	125	646
	女		3	81	68	136	223	61	572
D (要医療)	男		6	106	70	79	122	39	422
	女		2	22	20	34	43	7	128
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

膵機能

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		37	521	390	634	1,363	481	3,426
	女		25	691	441	831	1,151	200	3,339
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		1	23	15	33	99	49	220
	女		1	24	24	39	74	17	179
D (要医療)	男		1	11	10	19	78	37	156
	女		0	4	6	22	38	5	75
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

心筋・筋疾患

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		35	505	361	609	1,330	486	3,326
	女		22	643	418	777	1,090	187	3,137
B (軽度異常)	男		2	42	47	71	202	79	443
	女		4	75	51	113	169	35	447
C (要観察)	男		2	6	7	6	8	2	31
	女		0	1	1	1	3	0	6
D (要医療)	男		0	2	0	0	0	0	2
	女		0	0	1	1	1	0	3
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593



脂質代謝




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		20	182	125	240	663	276	1,506
	女		19	413	178	296	505	111	1,522
B (軽度異常)	男		8	153	115	215	469	165	1,125
	女		0	150	117	265	393	65	990
C (要観察)	男		10	176	138	199	342	98	963
	女		3	115	137	283	315	38	891
D (要医療)	男		1	44	37	32	66	28	208
	女		4	41	39	48	50	8	190
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

糖代謝

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		13	181	78	74	139	50	535
	女		18	421	147	96	119	26	827
B (軽度異常)	男		25	275	187	282	595	220	1,584
	女		8	262	241	459	577	94	1,641
C (要観察)	男		1	89	117	268	606	238	1,319
	女		0	33	77	303	499	80	992
D (要医療)	男		0	10	33	62	200	59	364
	女		0	3	6	34	68	22	133
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

腎機能

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		35	498	318	420	711	170	2,152
	女		21	634	387	609	693	100	2,444
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		4	51	91	243	682	300	1,371
	女		5	82	81	269	509	103	1,049
D (要医療)	男		0	6	6	23	147	97	279
	女		0	3	3	14	61	19	100
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593



尿一般




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		27	434	313	489	998	328	2,589
	女		11	351	244	388	536	86	1,616
B (軽度異常)	男		5	30	21	30	76	30	192
	女		2	22	10	10	16	2	62
C (要観察)	男		4	42	40	84	202	82	454
	女		2	88	43	139	212	37	521
D (要医療)	男		3	49	41	80	260	126	559
	女		11	258	173	354	495	95	1,386
合計	男		39	555	415	683	1,536	566	3,794
	女		26	719	470	891	1,259	220	3,585

痛風

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		31	441	321	549	1,273	486	3,101
	女		26	712	464	867	1,224	209	3,502
B (軽度異常)	男		6	70	64	99	202	57	498
	女		0	3	3	16	29	10	61
C (要観察)	男		0	36	25	35	49	17	162
	女		0	3	3	9	10	3	28
D (要医療)	男		2	8	5	3	16	7	41
	女		0	1	1	0	0	0	2
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593

免疫反応

判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		39	502	363	561	1,288	442	3,195
	女		23	634	385	726	1,070	190	3,028
B (軽度異常)	男		0	13	16	34	71	31	165
	女		0	31	13	36	53	16	149
C (要観察)	男		0	37	34	81	154	82	388
	女		2	50	68	124	128	14	386
D (要医療)	男		0	3	2	10	27	12	54
	女		1	4	5	6	12	2	30
合計	男		39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女		26	719	471	892	1,263	222	3,593



感染症

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	39	541	405	666	1,490	543	3,684
	女	26	711	457	869	1,229	216	3,508
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男	0	14	10	20	50	24	118
	女	0	8	14	23	34	6	85
合計	男	39	555	415	686	1,540	567	3,802
	女	26	719	471	892	1,263	222	3,593

肺機能

(令和2年4月13日以降中止)




(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	1	13	12	12	35	20	93
	女	1	11	3	8	36	8	67
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	0	1	0	3	9	4	17
	女	0	0	0	1	4	0	5
D (要医療)	男	0	0	0	0	6	5	11
	女	0	2	1	1	2	0	6
合計	男	1	14	12	15	50	29	121
	女	1	13	4	10	42	8	78

内臓脂肪

(人)

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	0	79	55	78	167	68	447
	女	0	60	48	122	151	31	412
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	0	37	34	55	100	26	252
	女	0	4	9	8	20	6	47
D (要医療)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
合計	男	0	116	89	133	267	94	699
	女	0	64	57	130	171	37	459



動脈硬化


判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		0	122	98	183	374	127	904
	女		0	78	85	211	324	46	744
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		0	14	25	55	185	56	335
	女		0	16	19	69	127	26	257
D (要医療)	男		0	0	0	1	1	4	6
	女		0	1	0	0	1	0	2
合計	男		0	136	123	239	560	187	1,245
	女		0	95	104	280	452	72	1,003

甲状腺機能


判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		0	63	50	99	221	70	503
	女		1	91	70	126	139	21	448
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		0	23	20	14	15	4	76
	女		0	9	9	16	22	2	58
合計	男		0	86	70	113	236	74	579
	女		1	100	79	142	161	23	506

BNP


判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男		0	111	77	132	185	37	542
	女		1	66	51	117	110	11	356
B (軽度異常)	男		0	1	6	19	94	33	153
	女		0	11	11	40	82	12	156
C (要観察)	男		0	0	0	3	2	0	5
	女		0	0	1	1	2	1	5
D (要医療)	男		0	0	1	5	46	28	80
	女		0	0	0	10	19	10	39
合計	男		0	112	84	159	327	98	780
	女		1	77	63	168	213	34	556



動脈硬化



甲状腺機能



BNP

喀痰細胞診




判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	1	109	78	122	369	123	802
	女	1	34	25	63	149	24	296
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	0	1	1	0	0	0	2
	女	0	0	0	0	0	0	0
D (要医療)	男	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0
F (判定不能)	男	0	8	3	9	17	8	45
	女	1	5	4	6	21	2	39
合計	男	1	118	82	131	386	131	849
	女	2	39	29	69	170	26	335

胃がんリスク

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	1	129	59	58	70	14	331
	女	0	206	49	63	56	3	377
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男	1	50	28	36	61	25	201
	女	0	66	33	22	42	6	169
合計	男	2	179	87	94	131	39	532
	女	0	272	82	85	98	9	546

前立腺がん

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
A (異常なし)	男	3	98	321	552	1,251	410	2,635
B (軽度異常)	男	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男	—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男	0	0	3	33	133	62	231
合計	男	3	98	324	585	1,384	472	2,866



腫瘍マーカー




判定		性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	(人) 合計
A (異常なし)	男		0	143	123	232	467	130	1,095
	女		2	139	116	261	321	44	883
B (軽度異常)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	男		—	—	—	—	—	—	—
	女		—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	男		0	8	7	23	34	13	85
	女		0	7	6	14	19	10	56
合計	男		0	151	130	255	501	143	1,180
	女		2	146	122	275	340	54	939

女性腫瘍マーカー

判定	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	(人) 合計
A (異常なし)	女	2	154	128	260	302	38	884
B (軽度異常)	女	—	—	—	—	—	—	—
C (要観察)	女	—	—	—	—	—	—	—
D (要医療)	女	0	17	2	0	2	0	21
合計	女	2	171	130	260	304	38	905



認知症簡易検査

	性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	(人) 合計
対象者数	男	—	—	—	—	561	456	1,017
	女	—	—	—	—	410	174	584
実施人数	男	—	—	—	—	202	146	348
	女	—	—	—	—	169	59	228
実施率	男	—	—	—	—	36.0%	32.0%	34.2%
	女	—	—	—	—	41.2%	33.9%	39.0%
21点以上	男	—	—	—	—	202	139	341
	女	—	—	—	—	168	55	223
20点以下 (疑いあり)	男	—	—	—	—	0	7	7
	女	—	—	—	—	1	4	5



年度別精密検査分析



検査	年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
							異常なし	がん	がん以外		
胃部X線	28	8,042	658	8.18	448	68.09	36	9	403	0.11	1.37
	29	7,887	496	6.29	337	67.94	32	4	301	0.05	0.81
	30	7,662	451	5.89	307	68.07	17	7	283	0.09	1.55
	1	7,226	752	10.41	494	65.69	35	11	448	0.15	1.46
	2	5,559	644	11.58	425	65.99	36	9	380	0.16	1.40
胸部X線	28	9,462	184	1.94	129	70.11	35	5	89	0.05	2.72
	29	9,494	588	6.19	450	76.53	134	4	312	0.04	0.68
	30	9,505	397	4.18	302	76.07	83	5	214	0.05	1.26
	1	9,360	244	2.61	165	67.62	39	6	120	0.06	2.46
	2	7,311	163	2.23	111	68.10	28	5	78	0.07	3.07
便潜血	28	9,448	728	7.71	469	64.42	142	21	306	0.22	2.88
	29	9,491	714	7.52	427	59.80	121	17	289	0.18	2.38
	30	9,492	648	6.83	422	65.12	113	17	292	0.18	2.62
	1	9,306	687	7.38	427	62.15	123	11	293	0.12	1.60
	2	7,278	562	7.72	356	63.35	95	11	250	0.15	1.96
超音波	28	9,563	694	7.26	447	64.41	88	4	355	0.04	0.58
	29	9,623	922	9.58	623	67.57	131	7	485	0.07	0.76
	30	9,629	939	9.75	642	68.37	166	9	467	0.09	0.96
	1	9,475	810	8.55	514	63.46	159	6	349	0.06	0.74
	2	7,392	741	10.02	453	61.13	166	5	282	0.07	0.67



便潜血

【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	35	24	528	648	390	435	623	824	1,363	1,172	486	188	3,425	3,291
B (軽度異常)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (要観察)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (要医療)	3	1	23	47	22	22	57	57	161	73	70	26	336	226
合計	38	25	551	695	412	457	680	881	1,524	1,245	556	214	3,761	3,517



便潜血


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	3	1	23	47	22	22	57	57	161	73	70	26	336	226
精検受診者数	0	1	10	27	12	13	38	41	102	50	47	15	209	147
異常なし	0	1	1	15	5	5	8	12	21	16	7	4	42	53
大腸がん（早期）	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	5	4
大腸がん（進行）	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
大腸がん（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸ポリープ（腺腫）	0	0	2	2	2	3	15	13	44	14	21	5	84	37
大腸ポリープ（過形成）	0	0	1	0	1	2	0	2	7	3	3	0	12	7
大腸ポリープ（不明）	0	0	0	0	1	0	5	4	7	3	6	1	19	8
大腸憩室	0	0	3	1	2	2	6	5	15	8	6	3	32	19
痔疾患	0	0	0	3	0	0	1	3	11	6	3	1	15	13
潰瘍性大腸炎	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
胃疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クローン氏病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患	0	0	5	4	2	0	5	2	5	5	6	2	23	13

複数回答あり

(男)



(女)



便潜血

【精密検査結果5年比較】

年度	(人)				
	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	728	714	648	687	562
精検受診者数	469	427	422	427	356
精検受診率 (%)	64.4	59.8	65.1	62.2	63.3

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	142	121	113	123	95
	28.86%	26.08%	24.73%	26.57%	24.23%
大腸がん (早期)	11	8	11	6	9
	2.24%	1.72%	2.41%	1.30%	2.30%
大腸がん (進行)	9	7	5	3	2
	1.83%	1.51%	1.09%	0.65%	0.51%
大腸がん (不明)	1	2	1	2	0
	0.20%	0.43%	0.22%	0.43%	0.00%
大腸ポリープ (腺腫)	142	137	141	147	121
	28.86%	29.53%	30.85%	31.75%	30.87%
大腸ポリープ (過形成)	22	33	24	17	19
	4.47%	7.11%	5.25%	3.67%	4.85%
大腸ポリープ (不明)	36	27	34	40	27
	7.32%	5.82%	7.44%	8.64%	6.89%
大腸憩室	64	58	51	54	51
	13.01%	12.50%	11.16%	11.66%	13.01%
痔疾患	43	31	33	24	28
	8.74%	6.68%	7.22%	5.18%	7.14%
潰瘍性大腸炎	4	4	6	3	4
	0.81%	0.86%	1.31%	0.65%	1.02%
胃疾患	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
クローン氏病	2	0	1	0	0
	0.41%	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%
その他の疾患	16	36	37	44	36
	3.25%	7.76%	8.10%	9.50%	9.18%



便潜血検査の受診者数は、男性3,761人、女性3,517人で総受診者数は7,278人であり、判定別の男女計数はA (異常なし) 6,716人 (92.3%)、D (要医療) は562人 (7.7%) であった。
D (要医療) のうち、精検受診者数は356人であり、精検受診率*2は63.3%であった。
また、がん発見率*3は0.15%、陽性反応的中度*4は1.96%であった。

- *2 精検受診率とは、D (要医療) のうち精密検査を受けた者の割合
- *3 がん発見率とは、総受診者のうちがんが発見された者の割合
- *4 陽性反応的中度とは、D (要医療) のうちがんが発見された者の割合

眼底・眼圧

【検査結果】


判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	32	24	431	598	272	342	357	474	597	513	170	67	1,859	2,018
B (軽度異常)	3	0	25	34	28	19	86	113	274	242	110	51	526	459
C (要観察)	2	2	23	27	36	53	113	130	292	243	135	44	601	499
D (要医療)	2	0	75	57	76	54	119	153	337	236	122	49	731	549
F (判定不能)	0	0	0	1	1	0	7	7	24	10	20	8	52	26
合計	39	26	554	717	413	468	682	877	1,524	1,244	557	219	3,769	3,551



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	32	24	432	599	273	343	361	481	605	519	174	67	1,877	2,033
視神経乳頭陥凹	3	2	56	55	76	67	128	134	285	213	122	39	670	510
網膜異常	0	0	6	6	5	9	25	32	61	43	26	12	123	102
黄斑異常	0	0	11	8	19	18	52	70	156	107	64	17	302	220
詳細不明	0	0	0	1	1	0	7	9	26	14	23	9	57	33
網膜出血	0	0	6	1	4	5	14	11	52	37	21	8	97	62
視神経乳頭異常	2	0	5	7	4	3	5	10	18	16	14	4	48	40
視神経線維束欠損	1	0	6	3	6	11	10	17	25	18	5	3	53	52
白内障	0	0	0	1	0	0	5	8	28	35	15	6	48	50
黄斑変性	0	0	6	1	2	2	15	9	30	26	17	3	70	41
白斑	1	0	9	9	10	7	53	86	165	191	64	58	302	351
その他	0	0	16	19	17	10	38	73	176	114	82	21	329	237

複数回答あり



所見の「異常なし」には、軽微なため所見では「異常なし」としたが、血管性変化により検査結果ではB (軽度異常) になる場合を含む。また、片側の所見が「詳細不明」の場合、もう片側が「異常なし」であっても検査結果はF (判定不能) となる。

眼底・眼圧


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	0	75	57	76	54	119	153	337	236	122	49	731	549
精検受診者数	0	0	38	40	36	35	75	116	224	181	76	37	449	409
異常なし	0	0	8	7	5	4	7	13	15	11	9	6	44	41
白内障	0	0	0	0	1	1	5	13	56	48	14	11	76	73
緑内障	0	0	5	8	8	9	21	32	74	49	34	15	142	113
視神経乳頭陥凹	0	0	17	15	15	12	25	24	43	36	10	5	110	92
高眼圧症	0	0	3	11	3	0	1	4	8	4	1	0	16	19
黄斑上(前)膜	0	0	2	0	2	3	9	21	29	29	8	3	50	56
黄斑変性	0	0	1	0	1	0	6	5	15	7	3	1	26	13
糖尿病性網膜症	0	0	0	0	1	2	2	2	8	1	4	0	15	5
眼底出血	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	3	1	9	11
その他	0	0	2	2	3	7	9	19	33	32	7	7	54	67

複数回答あり

(男)



(女)



眼底・眼圧

【精密検査結果5年比較】

年度	(人)				
	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	1,601	1,708	1,888	1,708	1,280
精検受診者数	1,110	1,129	1,278	1,127	858
精検受診率 (%)	69.3	66.1	67.7	66.0	67.0

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	115	112	158	130	85
	8.38%	7.99%	9.83%	9.29%	8.24%
白内障	192	217	226	187	149
	13.98%	15.49%	14.06%	13.36%	14.44%
緑内障	317	307	313	324	255
	23.09%	21.91%	19.48%	23.14%	24.71%
視神経乳頭陥凹	290	296	354	295	202
	21.12%	21.13%	22.03%	21.07%	19.57%
高眼圧症	24	22	31	28	35
	1.75%	1.57%	1.93%	2.00%	3.39%
黄斑上(前)膜	104	136	163	137	106
	7.57%	9.71%	10.14%	9.79%	10.27%
黄斑変性	53	58	70	49	39
	3.86%	4.14%	4.36%	3.50%	3.78%
糖尿病性網膜症	34	32	30	21	20
	2.48%	2.28%	1.87%	1.50%	1.94%
眼底出血	20	35	30	34	20
	1.46%	2.50%	1.87%	2.43%	1.94%
その他	224	186	232	195	121
	16.31%	13.28%	14.44%	13.93%	11.72%

眼底検査、眼圧検査の受診者数は男性3,769人、女性3,551人で総受診者数は7,320人であり、判定別の男女計数はA(異常なし)は3,877人(52.9%)、B(軽度異常)は985人(13.5%)、C(要観察)は1,100人(15.0%)、D(要医療)は1,280人(17.5%)、F(判定不能)は78人(1.1%)であった。



D(要医療)のうち、精検受診者数は858人であり、精検受診率は67.0%であった。

また、平成29年度までは、眼底検査と眼圧検査はそれぞれ単独で判定していたが、平成30年度から、眼圧検査のデータは眼底写真を判定するための参考データとした。

心電図


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	15	14	238	507	219	314	331	532	667	700	151	93	1,621	2,160
B (軽度異常)	19	7	215	122	116	75	166	141	348	191	122	38	986	574
C (要観察)	3	5	81	76	59	57	126	161	321	274	169	58	759	631
D (要医療)	2	0	21	14	20	24	63	55	203	98	124	32	433	223
合計	39	26	555	719	414	470	686	889	1,539	1,263	566	221	3,799	3,588



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	15	14	238	507	219	314	331	532	667	700	151	93	1,621	2,160
洞性徐脈	3	3	46	19	26	23	56	40	129	45	52	7	312	137
1度房室ブロック	0	0	11	1	11	3	37	27	164	49	95	15	318	95
非特異的T波異常	0	3	19	53	15	33	46	92	69	144	47	27	196	352
完全右脚ブロック	0	1	11	0	15	7	31	17	127	49	71	14	255	88
右室伝導遅延	2	0	17	4	7	5	14	23	36	31	10	5	86	68
左軸偏位	1	1	5	5	7	4	24	11	58	23	29	9	124	53
反時計軸回転	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
早期再分極	5	0	64	0	33	3	16	3	25	6	2	0	145	12
左室肥大	0	0	16	1	17	7	27	18	77	39	31	15	168	80
その他	16	5	148	129	79	77	143	151	306	216	151	54	843	632



心電図


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	0	21	14	20	24	63	55	203	98	124	32	433	223
精検受診者数	0	0	8	10	10	10	34	36	133	70	75	24	260	150
異常なし	0	0	3	6	4	4	9	11	24	14	11	5	51	40
不整脈	0	0	2	4	4	2	19	12	61	26	37	9	123	53
虚血性心疾患	0	0	1	0	0	0	1	4	17	2	5	5	24	11
心室伝導障害	0	0	2	0	1	1	2	0	10	4	5	0	20	5
心肥大	0	0	0	0	0	0	2	6	12	6	5	3	19	15
弁膜症	0	0	0	0	0	1	0	3	7	8	4	1	11	13
房室伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	5	2
その他	0	0	0	0	1	2	2	0	13	11	13	2	29	15

複数回答あり

(男)



(女)



心電図

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	
要精検者数	772	708	817	862	656	
精検受診者数	514	475	555	534	410	
精検受診率 (%)	66.6	67.1	67.9	61.9	62.5	
	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率			
異常なし	112	118	145	136	91	
	19.86%	22.61%	23.97%	22.97%	20.87%	
不整脈	231	212	237	208	176	
	40.96%	40.61%	39.17%	35.14%	40.37%	
虚血性心疾患	53	51	51	50	35	
	9.40%	9.77%	8.43%	8.45%	8.03%	
心室伝導障害	35	28	33	34	25	
	6.21%	5.36%	5.45%	5.74%	5.73%	
心肥大	31	36	48	42	34	
	5.50%	6.90%	7.93%	7.09%	7.80%	
弁膜症	29	24	30	31	24	
	5.14%	4.60%	4.96%	5.24%	5.50%	
房室伝導障害	18	20	20	12	7	
	3.19%	3.83%	3.31%	2.03%	1.61%	
その他	55	33	41	79	44	
	9.75%	6.32%	6.78%	13.34%	10.09%	



心電図検査の受診者数は男性3,799人、女性3,588人で総受診者数は7,387人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は3,781人（51.2%）、B（軽度異常）は1,560人（21.1%）、C（要観察）は1,390人（18.8%）、D（要医療）は656人（8.9%）であった。

D（要医療）のうち精検受診者数は410人であり、精検受診率は62.5%であった。

胸部X線


【検査結果】

判定													(人)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	36	20	448	612	285	346	316	415	411	323	65	22	1,561	1,738
B (軽度異常)	2	4	91	90	111	105	301	398	881	790	351	140	1,737	1,527
C (要観察)	0	0	13	5	14	11	55	47	172	115	109	44	363	222
D (要医療)	1	0	2	3	5	6	6	16	56	23	35	10	105	58
合計	39	24	554	710	415	468	678	876	1,520	1,251	560	216	3,766	3,545



【所見】

所見													(件)	
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	36	20	448	612	285	346	316	415	411	323	65	22	1,561	1,738
石灰化陰影	0	0	1	2	3	6	16	19	67	54	37	11	124	92
網状陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	31	2	54	6
胸膜肥厚・癒着陰影	0	0	34	21	28	51	70	109	201	194	90	28	423	403
孤立性結節陰影	1	0	3	2	2	8	13	15	45	34	22	7	86	66
大動脈の蛇行	0	0	2	0	3	3	48	31	146	121	66	29	265	184
大動脈の石灰化陰影	0	0	4	3	11	13	136	159	617	484	325	129	1,093	788
骨硬化陰影	0	0	5	0	1	3	6	4	25	11	8	1	45	19
心陰影の拡大	0	0	15	20	26	21	46	131	157	281	100	84	344	537
その他	2	6	46	60	61	33	94	113	196	128	66	23	465	363



胸部X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	1	0	2	3	5	6	6	16	56	23	35	10	105	58
精検受診者数	0	0	1	3	1	5	3	12	37	18	23	8	65	46
異常なし	0	0	1	0	1	2	2	3	9	4	4	2	17	11
非結核性炎症性肺疾患	0	0	0	1	0	2	0	2	7	8	6	1	13	14
原発性肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	4	1
陳旧性炎症性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
気管支拡張症	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2
肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陳旧性肺結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
間質性肺炎・肺線維症	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0
良性肺腫瘍	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
非結核性抗酸菌症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2	0	0	1	6	15	4	10	3	26	15

複数回答あり

(男)



(女)



胸部X線

【精密検査結果5年比較】					(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	184	588	397	244	163
精検受診者数	129	450	302	165	111
精検受診率 (%)	70.1	76.5	76.1	67.6	68.1

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	35	134	83	39	28
	31.53%	28.76%	26.02%	23.08%	24.14%
非結核性炎症性肺疾患	39	68	61	35	27
	35.14%	14.59%	19.12%	20.71%	23.28%
肺がん	5	4	5	6	5
	4.50%	0.86%	1.57%	3.55%	4.31%
陳旧性炎症性肺疾患	0	7	15	3	1
	0.00%	1.50%	4.70%	1.78%	0.86%
気管支拡張症	4	15	8	4	4
	3.60%	3.22%	2.51%	2.37%	3.45%
肺炎	1	3	1	1	0
	0.90%	0.64%	0.31%	0.59%	0.00%
陳旧性肺結核	1	5	0	0	0
	0.90%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%
肺気腫	4	21	8	5	2
	3.60%	4.51%	2.51%	2.96%	1.72%
間質性肺炎・肺線維症	2	19	18	12	6
	1.80%	4.08%	5.64%	7.10%	5.17%
良性肺腫瘍	5	6	5	1	2
	4.50%	1.29%	1.57%	0.59%	1.72%
非結核性抗酸菌症	1	0	0	1	0
	0.90%	0.00%	0.00%	0.59%	0.00%
その他	14	184	115	62	41
	12.61%	39.48%	36.05%	36.69%	35.34%

胸部X線検査の受診者数は男性3,766人、女性3,545人で総受診者数は7,311人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は3,299人（45.2%）、B（軽度異常）は3,264人（44.6%）、C（要観察）は585人（8.0%）、D（要医療）は163人（2.2%）であった。



D（要医療）のうち、精検受診者数は111人であり、精検受診率は68.1%であった。

また、がん発見率は0.07%、陽性反応的中度は3.07%であった。

胃部X線


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	27	15	286	288	164	131	162	165	240	154	54	29	933	782
B (軽度異常)	4	5	94	180	82	110	93	165	165	183	39	18	477	661
C (要観察)	5	1	87	86	83	78	216	217	614	367	237	71	1,242	820
D (要医療)	3	0	37	47	33	31	96	72	169	105	35	16	373	271
合計	39	21	504	601	362	350	567	619	1,188	809	365	134	3,025	2,534



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	27	15	286	288	164	131	161	165	240	153	54	29	932	781
胃ポリープ	2	5	89	201	74	132	96	184	170	197	43	24	474	743
萎縮性胃炎	3	1	47	65	61	58	179	160	496	267	181	53	967	604
慢性胃炎	6	0	54	39	43	26	105	87	203	126	62	22	473	300
十二指腸憩室	1	0	15	17	13	15	45	71	144	154	68	28	286	285
十二指腸潰瘍癒痕	2	0	24	5	20	7	35	10	52	18	15	5	148	45
胃潰瘍癒痕	0	0	1	3	6	3	24	6	47	14	14	0	92	26
胃潰瘍	0	0	2	0	1	2	4	0	4	1	2	0	13	3
胃粘膜下腫瘍	0	0	2	4	2	3	5	6	16	20	2	5	27	38
その他	0	5	62	128	68	132	156	296	449	500	228	97	963	1,158



胃部X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	3	0	37	47	33	31	96	72	169	105	35	16	373	271
精検受診者数	1	0	20	29	20	22	58	53	114	75	22	11	235	190
異常なし	0	0	3	4	3	2	5	4	9	5	0	1	20	16
慢性胃炎	1	0	7	12	6	8	14	18	43	26	7	5	78	69
萎縮性胃炎	0	0	5	9	5	4	25	17	35	22	7	2	77	54
びらん性胃炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
胃ポリープ	0	0	1	4	3	5	6	11	17	18	4	1	31	39
胃潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
胃潰瘍癒痕	0	0	1	0	0	2	4	2	5	1	2	0	12	5
胃粘膜下腫瘍	1	0	1	1	3	1	0	2	6	6	3	0	14	10
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	3	1	1	0	2	2	7	3	4	0	17	6
十二指腸ポリープ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
早期胃がん	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	2	3
進行胃がん	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
食道がん	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
その他	0	0	3	3	3	4	13	12	20	15	5	3	44	37

複数回答あり

(男)



(女)



胃部X線

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	658	496	451	752	644
精検受診者数	448	337	307	494	425
精検受診率 (%)	68.1	67.9	68.1	65.7	66.0

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率			
異常なし	36	32	17	35	36
	6.45%	7.44%	4.28%	5.56%	6.63%
慢性胃炎	195	138	112	175	147
	34.95%	32.09%	28.21%	27.78%	27.07%
萎縮性胃炎	64	63	72	134	131
	11.47%	14.65%	18.14%	21.27%	24.13%
びらん性胃炎	7	8	5	12	1
	1.25%	1.86%	1.26%	1.90%	0.18%
胃ポリープ	102	62	56	93	70
	18.28%	14.42%	14.11%	14.76%	12.89%
胃潰瘍	7	9	3	5	2
	1.25%	2.09%	0.76%	0.79%	0.37%
胃潰瘍癒痕	18	13	21	20	17
	3.23%	3.02%	5.29%	3.17%	3.13%
胃粘膜下腫瘍	25	22	28	25	24
	4.48%	5.12%	7.05%	3.97%	4.42%
十二指腸潰瘍	3	3	1	3	0
	0.54%	0.70%	0.25%	0.48%	0.00%
十二指腸潰瘍癒痕	16	11	14	25	23
	2.87%	2.56%	3.53%	3.97%	4.24%
十二指腸ポリープ	3	7	4	4	2
	0.54%	1.63%	1.01%	0.63%	0.37%
早期胃がん	2	1	6	7	5
	0.36%	0.23%	1.51%	1.11%	0.92%
進行胃がん	5	2	1	0	2
	0.90%	0.47%	0.25%	0.00%	0.37%
食道がん	2	1	0	4	2
	0.36%	0.23%	0.00%	0.63%	0.37%
その他	73	58	57	88	81
	13.08%	13.49%	14.36%	13.97%	14.92%

胃部X線検査の受診者数は男性3,025人、女性2,534人で総受診者数は5,559人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は1,715人（30.9%）、B（軽度異常）は1,138人（20.5%）、C（要観察）は、2,062人（37.0%）、D（要医療）は644人（11.6%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は425人であり、精検受診率は66.0%であった。

また、がん発見率は0.16%、陽性反応的中度は1.40%であった。

腹部超音波 肝臓


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	25	24	276	487	133	236	218	389	577	561	240	102	1,469	1,799
B (軽度異常)	0	1	43	108	63	121	152	224	409	331	167	65	834	850
C (要観察)	12	1	213	94	209	101	299	269	513	356	145	54	1,391	875
D (要医療)	2	0	23	30	9	13	16	10	41	15	14	1	105	69
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	25	24	276	487	133	236	218	389	577	561	240	102	1,469	1,799
肝のう胞	0	0	76	127	121	151	270	303	574	442	217	78	1,258	1,101
脂肪肝	12	0	206	67	197	71	264	219	445	289	118	43	1,242	689
肝血管腫	2	1	34	59	24	43	50	58	96	75	23	8	229	244
肝内石灰化	0	1	6	3	4	4	17	17	83	46	34	4	144	75
慢性肝炎	0	0	0	0	1	0	2	0	4	1	1	0	8	1
門脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1
肝腫瘍	0	0	4	3	1	1	4	1	8	1	2	1	19	7
肝硬変	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0
その他	2	0	27	31	13	18	22	25	65	38	35	8	164	120



腹部超音波 肝臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	2	0	23	30	9	13	16	10	41	15	14	1	105	69
精検受診者数	2	0	10	18	5	8	11	8	24	11	11	0	63	45
異常なし	1	0	2	4	0	3	3	2	7	3	0	0	13	12
肝細胞がん	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
管内胆管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
転移性肝腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝血管腫	1	0	6	9	3	4	5	5	9	5	3	0	27	23
肝のう胞	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	2	0	5	4
肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝硬変	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
門脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	4	2	0	2	1	5	2	3	0	13	7

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 肝臓

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	172	213	261	206	174
精検受診者数	120	140	180	116	108
精検受診率 (%)	69.8	65.7	69.0	56.3	62.1

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率			
異常なし	10	10	32	19	25
	7.63%	6.37%	16.49%	16.24%	22.73%
肝臓がん	0	1	3	1	3
	0.00%	0.64%	1.55%	0.85%	2.73%
肝腫瘍	0	1	1	2	0
	0.00%	0.64%	0.52%	1.71%	0.00%
転移性肝腫瘍	0	1	1	2	0
	0.00%	0.64%	0.52%	1.71%	0.00%
肝血管腫	77	79	105	62	50
	58.78%	50.32%	54.12%	52.99%	45.45%
肝のう胞	15	41	24	13	9
	11.45%	26.11%	12.37%	11.11%	8.18%
肝炎	2	1	1	1	0
	1.53%	0.64%	0.52%	0.85%	0.00%
肝硬変	1	2	1	0	3
	0.76%	1.27%	0.52%	0.00%	2.73%
門脈瘤	1	1	0	0	0
	0.76%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
その他	25	20	26	17	20
	19.08%	12.74%	13.40%	14.53%	18.18%

腹部超音波（肝臓）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593人で総受診者数は7,392人であり、判定別の男女計数はA（異常なし）は3,268人（44.1%）、B（軽度異常）は1,684人（22.8%）、C（要観察）は2,266人（30.7%）、D（要医療）は174人（2.4%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は108人であり、精検受診率は62.1%であった。

また、がん発見率は0.04%、陽性反応的中度は1.72%であった。

腹部超音波 胆のう


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	28	19	385	575	269	357	377	612	873	835	310	150	2,242	2,548
B (軽度異常)	9	5	115	97	83	71	157	153	318	212	119	36	801	574
C (要観察)	2	1	43	33	50	33	125	107	297	175	113	31	630	380
D (要医療)	0	1	12	14	12	10	26	20	52	41	24	5	126	91
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	28	19	385	575	269	357	377	612	873	835	310	150	2,242	2,548
胆のうポリープ	8	5	146	106	108	81	180	157	317	214	94	29	853	592
胆石	0	1	14	17	22	22	74	54	171	115	69	17	350	226
総胆管拡張 (手術後含む)	0	0	1	3	0	1	8	15	50	43	24	17	83	79
胆泥	0	0	1	4	1	2	7	12	17	19	7	1	33	38
胆のう腺筋腫症	1	0	6	4	12	5	30	19	44	14	14	3	107	45
胆のう腫瘍	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	0	0	5	2
慢性胆のう炎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	2	1	19	19	25	12	78	69	202	99	85	15	411	215



腹部超音波 胆のう


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	1	12	14	12	10	26	20	52	41	24	5	126	91
精検受診者数	0	0	3	5	6	6	13	12	27	27	13	3	62	53
異常なし	0	0	1	0	1	0	6	3	8	6	5	2	21	11
胆のうがん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆のう腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胆石	0	0	1	1	2	2	3	6	11	9	4	1	21	19
胆のう腺筋腫症	0	0	0	2	2	4	1	3	3	3	3	0	9	12
胆のうポリープ	0	0	1	0	3	2	2	0	2	4	1	1	9	7
胆泥	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4
胆のう炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総胆管拡張（手術後含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
その他	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3	0	0	3	5

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 胆のう

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	
要精検者数	240	354	317	256	217	
精検受診者数	146	218	199	164	115	
精検受診率 (%)	60.8	61.6	62.8	64.1	53.0	

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	26	48	35	36	32
	16.15%	18.60%	15.22%	19.89%	25.60%
胆のうがん	0	1	0	0	0
	0.00%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
胆管がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
胆のう腫瘍	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
胆管腫瘍	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
胆石	75	98	95	74	40
	46.58%	37.98%	41.30%	40.88%	32.00%
胆のう腺筋腫症	22	45	54	36	21
	13.66%	17.44%	23.48%	19.89%	16.80%
胆のうポリープ	10	26	15	18	16
	6.21%	10.08%	6.52%	9.94%	12.80%
胆泥	5	4	9	3	5
	3.11%	1.55%	3.91%	1.66%	4.00%
胆のう炎	2	2	3	1	1
	1.24%	0.78%	1.30%	0.55%	0.80%
総胆管拡張	4	13	4	5	2
	2.48%	5.04%	1.74%	2.76%	1.60%
その他	17	21	15	8	8
	10.56%	8.14%	6.52%	4.42%	6.40%

腹部超音波（胆のう）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593で総受診者数は7,392人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は4,790人（64.8%）、B（軽度異常）は1,375人（18.6%）、C（要観察）は1,010人（13.7%）、D（要医療）は217人（2.9%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は115人であり、精検受診率は53.0%であった。

なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

腹部超音波 膵臓


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	38	26	528	708	383	463	629	859	1,341	1,164	483	186	3,402	3,406
B (軽度異常)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
C (要観察)	0	0	19	4	17	3	30	24	116	62	47	28	229	121
D (要医療)	1	0	8	7	14	4	26	9	83	37	35	8	167	65
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	38	26	528	708	383	463	629	859	1,341	1,164	483	186	3,402	3,406
膵のう胞	0	0	3	7	4	2	10	25	54	72	25	25	96	131
膵管拡張	0	0	1	0	2	2	11	2	44	19	16	10	74	33
膵管内乳頭粘液産生腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
慢性膵炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
膵石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
膵腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	3	2	5	6
その他	1	0	23	3	25	4	37	4	105	10	44	2	235	23



腹部超音波 膵臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	1	0	8	7	14	4	26	9	83	37	35	8	167	65
精検受診者数	1	0	6	2	8	3	15	6	54	33	27	6	111	50
異常なし	1	0	3	0	7	3	12	1	34	13	21	2	78	19
膵臓がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
膵臓腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
膵管内乳頭粘液産生腫瘍	0	0	2	1	0	0	1	3	7	8	3	2	13	14
膵のう胞	0	0	0	1	0	0	2	3	6	8	0	2	8	14
膵管拡張	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2
膵炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	2	0	7	2

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 膵臓

【精密検査結果5年比較】					(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	99	160	177	183	232
精検受診者数	73	132	130	131	161
精検受診率 (%)	73.7	82.5	73.4	71.6	69.4

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	33	53	55	75	97
	44.00%	37.59%	41.04%	58.14%	59.51%
膵臓がん	0	1	3	2	1
	0.00%	0.71%	2.24%	1.55%	0.61%
膵臓腫瘍	0	2	1	1	1
	0.00%	1.42%	0.75%	0.78%	0.61%
膵管内乳頭粘液産生腫瘍	17	27	21	19	27
	22.67%	19.15%	15.67%	14.73%	16.56%
膵のう胞	19	36	41	24	22
	25.33%	25.53%	30.60%	18.60%	13.50%
膵管拡張	1	12	6	2	5
	1.33%	8.51%	4.48%	1.55%	3.07%
膵炎	0	4	1	2	1
	0.00%	2.84%	0.75%	1.55%	0.61%
その他	5	6	6	4	9
	6.67%	4.26%	4.48%	3.10%	5.52%

腹部超音波（膵臓）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593人で総受診者数は7,392人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は6,808人（92.1%）、B（軽度異常）は2人（0.1%）、C（要観察）は350人（4.7%）、D（要医療）は232人（3.1%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は161人であり、精検受診率は69.4%であった。

また、がん発見率は0.01%、陽性反応的中度は0.43%であった。

腹部超音波 腎臓


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	33	23	414	593	255	366	309	587	546	703	158	114	1,715	2,386
B (軽度異常)	6	2	133	105	150	96	356	275	911	508	372	99	1,928	1,085
C (要観察)	0	0	7	12	7	9	18	23	71	47	32	8	135	99
D (要医療)	0	1	1	9	2	0	2	7	12	5	4	1	21	23
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	33	23	414	594	256	367	312	587	553	706	163	115	1,731	2,392
腎のう胞	1	2	89	69	106	62	317	212	864	436	372	94	1,749	875
腎結石	5	1	73	48	88	54	155	105	348	163	112	27	781	398
腎血管筋脂肪腫	0	0	4	10	1	3	4	14	20	22	8	2	37	51
腎障害	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	4	0	10	2
水腎症	0	0	0	1	1	0	1	1	4	2	4	1	10	5
慢性腎不全	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0
腎腫瘍	0	1	0	1	0	1	1	1	2	1	0	1	3	6
副腎腫瘍	0	0	1	0	0	0	1	1	8	2	1	2	11	5
その他	0	0	5	18	9	8	13	34	51	63	32	13	110	136



所見の「異常なし」には、片腎切除、術後変形、形成不全などで、検査結果ではB (軽度異常) となる場合を含む。

腹部超音波 腎臓


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	1	1	9	2	0	2	7	12	5	4	1	21	23
精検受診者数	0	1	1	7	1	0	0	2	8	3	2	1	12	14
異常なし	0	1	1	4	0	0	0	2	3	1	0	0	4	8
腎細胞がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腎盂がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腎腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
副腎腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
腎のう胞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
腎血管筋脂肪腫	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3
慢性腎臓病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腎結石	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
水腎症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尿管がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尿管結石	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
その他	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 腎臓

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	
要精検者数	72	91	71	61	44	
精検受診者数	43	51	42	38	26	
精検受診率 (%)	59.7	56.0	59.2	62.3	59.1	

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	7	10	10	13	12
	14.89%	18.18%	21.74%	34.21%	41.38%
腎臓がん	0	0	2	0	0
	0.00%	0.00%	4.35%	0.00%	0.00%
腎腫瘍	1	2	2	1	1
	2.13%	3.64%	4.35%	2.63%	3.45%
副腎腫瘍	2	0	2	2	1
	4.26%	0.00%	4.35%	5.26%	3.45%
腎のう胞	9	12	5	6	3
	19.15%	21.82%	10.87%	15.79%	10.34%
腎血管筋脂肪腫	5	10	10	6	5
	10.64%	18.18%	21.74%	15.79%	17.24%
慢性腎臓病	4	2	2	2	0
	8.51%	3.64%	4.35%	5.26%	0.00%
腎結石	4	2	4	2	2
	8.51%	3.64%	8.70%	5.26%	6.90%
水腎症	1	1	1	0	0
	2.13%	1.82%	2.17%	0.00%	0.00%
尿管がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
尿管結石	2	0	1	0	2
	4.26%	0.00%	2.17%	0.00%	6.90%
その他	12	16	7	6	3
	25.53%	29.09%	15.22%	15.79%	10.34%

腹部超音波（腎臓）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593人で総受診者数は7,392人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は4,101人（55.4%）、B（軽度異常）は3,013人（40.8%）、C（要観察）は234人（3.2%）、D（要医療）は44人（0.6%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は26人であり、精検受診率は59.1%であった。

なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

腹部超音波 脾臓

【検査結果】


判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	38	26	533	674	399	447	640	854	1,436	1,193	516	208	3,562	3,402
B (軽度異常)	1	0	22	43	13	22	44	35	98	68	49	13	227	181
C (要観察)	0	0	0	0	1	1	1	3	6	0	0	1	8	5
D (要医療)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	0	2	5
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	38	26	533	674	399	447	640	854	1,436	1,193	516	208	3,562	3,402
副脾	0	0	10	36	4	18	10	13	25	13	7	2	56	82
脾石灰化	0	0	1	1	0	0	2	3	8	7	4	1	15	12
脾臓腫大	1	0	4	2	4	0	4	1	5	3	0	0	18	6
脾のう胞	0	0	0	2	1	1	0	5	2	2	1	1	4	11
脾血管腫	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3
脾膿瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	8	3	8	5	30	17	65	44	38	10	149	79

複数回答あり




腹部超音波 脾臓

【精密検査結果】 (件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	0	2	5
精検受診者数	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4
異常なし	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾のう胞	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
脾血管腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脾腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
副脾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 脾臓

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	4	5	11	8	7
精検受診者数	2	4	10	4	5
精検受診率 (%)	50.0	80.0	90.9	50.0	71.4

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
異常なし	0 0.00%	1 25.00%	3 30.00%	0 0.00%	3 60.00%
悪性リンパ腫	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
脾腫瘍	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
脾のう胞	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 20.00%
脾血管腫	0 0.00%	0 0.00%	1 10.00%	0 0.00%	0 0.00%
脾腫	0 0.00%	0 0.00%	2 20.00%	0 0.00%	0 0.00%
副脾	0 0.00%	1 25.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
その他	2 100.00%	2 50.00%	4 40.00%	4 100.00%	1 20.00%



腹部超音波（脾臓）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593人で総受診者数は7,392人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は6,964人（94.2%）、B（軽度異常）は408人（5.5%）、C（要観察）は13人（0.2%）、D（要医療）は7人（0.1%）であった。また、A（異常なし）における大半は描出範囲内異常なしであった。

D（要医療）のうち精検受診者数は5人であり、精検受診率は71.4%であった。
なお、精密検査結果でがんと診断された者はいなかった。

腹部超音波 その他


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	38	23	535	520	382	333	534	761	1,036	1,074	315	189	2,840	2,900
B (軽度異常)	1	0	16	41	20	33	81	47	248	92	96	11	462	224
C (要観察)	0	2	4	124	8	91	61	78	226	86	144	16	443	397
D (要医療)	0	1	0	34	4	14	9	6	30	11	11	6	54	72
合計	39	26	555	719	414	471	685	892	1,540	1,263	566	222	3,799	3,593



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	38	23	535	520	382	333	534	761	1,036	1,074	315	189	2,840	2,900
前立腺石灰化	1	-	12	-	12	-	42	-	106	-	53	-	226	-
前立腺肥大	0	-	2	-	10	-	74	-	270	-	134	-	490	-
子宮筋腫	-	1	-	137	-	113	-	91	-	70	-	8	-	420
卵巣のう腫	-	2	-	30	-	14	-	14	-	27	-	10	-	97
腹部大動脈石灰化	0	0	1	2	2	4	22	13	78	65	52	8	155	92
腹部大動脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	8	1	22	2
膀胱憩室	0	0	0	0	2	0	4	0	6	3	9	1	21	4
膀胱ポリープ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
その他	0	0	5	43	11	15	28	21	128	37	78	6	250	122



腹部超音波 その他


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	1	0	34	4	14	9	6	30	11	11	6	54	72
精検受診者数	0	1	0	18	2	11	6	3	16	5	6	5	30	43
異常なし	0	1	0	8	0	4	3	2	5	1	1	1	9	17
膀胱がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
前立腺がん	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
婦人科がん	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
膀胱腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科腫瘍	-	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	1	-	3
膀胱結石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺肥大	0	-	0	-	1	-	1	-	3	-	1	-	6	-
子宮筋腫	-	0	-	6	-	4	-	0	-	0	-	1	-	11
卵巣のう腫	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-	2
腹部大動脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
その他の泌尿器疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
その他の婦人科疾患	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1
その他の血管疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
その他のがん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	1	0	3	1	1	2	1	4	2	3	1	10	9

複数回答あり

(男)



(女)



腹部超音波 その他

【精密検査結果5年比較】

(人)

年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	154	166	172	146	126
精検受診者数	90	112	110	84	73
精検受診率 (%)	58.4	67.5	64.0	57.5	57.9

(上段) 回答数 (下段) 回答内訳率

	(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率		(上段) 回答数	(下段) 回答内訳率
異常なし	23	35	47	28	26
	24.47%	29.41%	39.50%	32.18%	38.24%
膀胱がん	0	2	0	1	1
	0.00%	1.68%	0.00%	1.15%	1.47%
前立腺がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
婦人科がん	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
膀胱腫瘍	3	2	2	1	0
	3.19%	1.68%	1.68%	1.15%	0.00%
婦人科腫瘍	6	7	6	6	3
	6.38%	5.88%	5.04%	6.90%	4.41%
膀胱結石	1	1	1	0	0
	1.06%	0.84%	0.84%	0.00%	0.00%
前立腺肥大	5	12	11	2	6
	5.32%	10.08%	9.24%	2.30%	8.82%
子宮筋腫	17	17	17	27	11
	18.09%	14.29%	14.29%	31.03%	16.18%
卵巣のう腫	11	7	8	3	2
	11.70%	5.88%	6.72%	3.45%	2.94%
腹部大動脈瘤	4	4	3	2	3
	4.26%	3.36%	2.52%	2.30%	4.41%
その他の泌尿器疾患	2	0	1	0	1
	2.13%	0.00%	0.84%	0.00%	1.47%
その他の婦人科疾患	7	2	4	3	1
	7.45%	1.68%	3.36%	3.45%	1.47%
その他の血管疾患	4	2	2	2	2
	4.26%	1.68%	1.68%	2.30%	2.94%
その他のがん	0	1	0	0	0
	0.00%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%
その他	11	27	17	12	12
	11.70%	22.69%	14.29%	13.79%	17.65%

腹部超音波（その他）検査の受診者数は男性3,799人、女性3,593人で総受診者数は7,392人あり、判定別の男女計数はA（異常なし）は5,740人（77.6%）、B（軽度異常）は686人（9.3%）、C（要観察）は840人（11.4%）、D（要医療）は126人（1.7%）であった。



D（要医療）のうち精検受診者数は73人であり、精検受診率は57.9%であった。

また、がん発見率は0.01%、陽性反応的中度は0.79%であった。

胸部断層X線


【検査結果】

判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	85	44	51	34	55	48	62	36	8	3	261	165
B (軽度異常)	0	0	19	10	15	11	62	43	166	100	62	16	324	180
C (要観察)	0	0	5	0	5	4	12	7	36	18	7	6	65	35
D (要医療)	0	0	0	0	2	0	1	3	11	2	6	1	20	6
合計	0	0	109	54	73	49	130	101	275	156	83	26	670	386



【所見】

所見	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	0	0	85	44	51	34	55	48	62	36	8	3	261	165
石灰化陰影	0	0	1	0	0	0	1	0	10	9	3	2	15	11
網状陰影	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1
胸膜肥厚・癒着陰影	0	0	10	4	4	7	15	14	48	26	19	1	96	52
孤立性結節陰影	0	0	2	0	1	2	8	7	22	14	7	4	40	27
癒痕像	0	0	1	2	2	1	15	5	39	16	10	3	67	27
のう胞状陰影	0	0	1	0	4	0	3	0	12	3	3	1	23	4
大動脈の石灰化陰影	0	0	0	0	3	0	27	15	124	58	54	16	208	89
リンパ節石灰化	0	0	2	0	0	0	2	0	4	2	0	0	8	2
その他	0	0	7	4	10	5	16	15	20	24	6	2	59	50



胸部断層X線


【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	0	0	2	0	1	3	11	2	6	1	20	6
精検受診者数	0	0	0	0	1	0	0	2	10	2	3	0	14	4
異常なし	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
非結核性炎症性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0
陳旧性炎症性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
原発性肺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
縦隔腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
気管支拡張症	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	0	6	1

複数回答あり

(男)




(女)



総合判定


判定	(人)		
	男	女	合計
A (異常なし)	0	0	0
B (軽度異常)	25	22	47
C (要観察)	381	471	852
D (要医療)	3,396	3,100	6,496
合計	3,802	3,593	7,395



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	153	71	224
身体計測	-	-	-
視力	1,840	1,694	3,534
眼底・眼圧	731	549	1,280
聴力	1,844	834	2,678
血圧	480	419	899
血液一般	217	283	500
肝機能	422	128	550
膵機能	156	75	231
心筋・筋疾患	2	3	5
脂質代謝	208	190	398
糖代謝	364	133	497

検査項目	(人)		
	男	女	合計
腎機能	279	100	379
尿一般	559	1,386	1,945
痛風	41	2	43
免疫反応	54	30	84
感染症	118	85	203
便潜血	336	226	562
肺機能	11	6	17
心電図	433	223	656
胸部X線	105	58	163
胃部X線	373	271	644
腹部超音波	435	306	741



【BMI・腹囲による判定（痩せ・肥満）】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）


(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	1,915	2,523	4,438
C1群（要観察）	132	399	531
C2群（要観察）	1,755	671	2,426
合計	3,802	3,593	7,395




【A群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風）】

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	4	9	36	167	15	34	5	15	15	9	2	1	77	235
B（軽度異常）	15	3	103	198	56	116	80	163	124	162	45	19	423	661
C（要観察）	8	3	100	117	97	151	189	331	441	520	165	69	1,000	1,191
D（要医療）	2	2	25	36	26	44	61	121	214	184	87	49	415	436
合計	29	17	264	518	194	345	335	630	794	875	299	138	1,915	2,523

(男)



(女)




【C1群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風）】


(人)

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	1	5	8	33	0	6	1	2	1	5	1	0	12	51
B（軽度異常）	0	1	6	43	2	23	6	31	16	32	6	5	36	135
C（要観察）	0	0	1	9	7	20	7	42	33	71	15	13	63	155
D（要医療）	0	2	0	6	0	5	1	11	13	27	7	7	21	58
合計	1	8	15	91	9	54	15	86	63	135	29	25	132	399

(男)



(女)




【C2群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風）】


(人)

生活習慣病判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	0	1	14	10	2	0	4	1	2	1	2	0	24	13
B（軽度異常）	5	0	67	41	35	13	43	21	84	27	26	7	260	109
C（要観察）	2	0	142	44	108	38	202	117	368	131	133	37	955	367
D（要医療）	2	0	53	15	67	21	87	37	229	94	78	15	516	182
合計	9	1	276	110	212	72	336	176	683	253	239	59	1,755	671

(男)




(女)



【生活習慣病判定（D判定）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	（人）		
	男	女	合計
血圧	18	34	52
脂質代謝	1	19	20
糖代謝	4	7	11
痛風	0	0	0

C2群	（人）		
	男	女	合計
血圧	242	118	360
脂質代謝	105	35	140
糖代謝	233	54	287
痛風	26	2	28



人間ドックの受診者数は男性3,802人、女性3,593人で総受診者数は7,395人であり、総合判定別ではA（異常なし）が0人（0.0%）、B（軽度異常）が47人（0.6%）、C（要観察）が852人（11.5%）、D（要医療）が6,496人（87.9%）であった。視力・聴力・尿一般の3項目でD（要医療）が多く、視力が3,534人、聴力が2,678人、尿一般が1,945人であった。

BMIと腹囲による判定（痩せ・肥満）

A群（異常なし）は4,438人（60.0%）、C1群（要観察）は531人（7.2%）、C2群（要観察）は2,426人（32.8%）であった。

各群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝・痛風）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性1,000人、女性1,191人で合計2,191人（49.4%）、D（要医療）は男性415人、女性436人で合計851人（19.2%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性63人、女性155人で合計218人（41.1%）、D（要医療）は男性21人、女性58人で合計79人（14.9%）であった。C2群（要観察）においては、C（要観察）は男性955人、女性367人で合計1,322人（54.5%）、D（要医療）は男性516人、女性182人で合計698人（28.8%）であった。


生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較

C1群（要観察）とC2群（要観察）においてD（要医療）と判定されたのは、C1群（要観察）では女性の血圧が多く、C2群（要観察）では男性の血圧と糖代謝が多かった。

3-1-2 脳ドック ■


【年代別受診者数】 (人)

性別	～39歳	40～49歳	50歳	51～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	0	26	240	31	61	78	16	452
女	1	10	397	21	53	59	9	550
合計	1	36	637	52	114	137	25	1,002
構成比	0.10%	3.59%	63.57%	5.19%	11.38%	13.67%	2.50%	100.00%



【月別受診者数】 (人)



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	41	-	96	97	100	98	109	92	87	81	88	113	1,002



MR I

【検査結果】



判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	11	7	82	170	2	9	1	2	0	0	96	188
B (軽度異常)	0	1	13	3	153	208	41	30	43	30	4	5	254	277
C (要観察)	0	0	0	0	11	6	8	7	19	14	7	3	45	30
D (要医療)	0	0	2	0	25	34	10	7	15	13	5	1	57	55
合計	0	1	26	10	271	418	61	53	78	59	16	9	452	550



MR A

【検査結果】



判定	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	24	9	220	350	44	47	44	43	8	7	340	456
B (軽度異常)	0	1	0	1	37	29	10	3	14	9	0	1	61	44
C (要観察)	0	0	2	0	3	10	5	2	11	2	4	1	25	15
D (要医療)	0	0	0	0	11	29	2	1	9	5	4	0	26	35
合計	0	1	26	10	271	418	61	53	78	59	16	9	452	550



頸動脈超音波

【検査結果】

判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	1	20	9	145	272	10	19	7	14	2	1	184	316
B (軽度異常)	0	0	5	1	90	111	24	29	28	31	5	3	152	175
C (要観察)	0	0	1	0	35	35	26	5	41	14	9	5	112	59
D (要医療)	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4	0
合計	0	1	26	10	271	418	61	53	78	59	16	9	452	550




【精密検査結果】

(件)


年齢・性別	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
要精検者数	0	0	2	0	35	57	12	8	24	18	6	1	79	84
精検受診者数	0	0	1	0	17	34	7	5	13	14	4	0	42	53
異常なし	0	0	0	0	1	4	2	1	1	2	0	0	4	7
動脈瘤（5mm以上）	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
動脈瘤（5mm未満）	0	0	0	0	4	5	1	1	3	3	0	0	8	9
悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新規脳梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陳旧性脳梗塞	0	0	0	0	2	3	1	1	3	1	1	0	7	5
陳旧性脳出血	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
血管腫	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
脳萎縮・認知症	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
慢性虚血性変化	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	3
耳鼻領域疾患	0	0	1	0	3	2	0	0	0	2	0	0	4	4
その他の腫瘍様疾患	0	0	0	0	2	7	0	0	0	1	1	0	3	8
その他の主要動脈疾患	0	0	0	0	3	3	3	0	5	1	1	0	12	4
その他の疾患	0	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	1	6
その他	0	0	0	0	1	7	0	0	0	1	1	0	2	8

複数回答あり

(男)



(女)



脳ドック

【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	
要精検者数	228	230	205	163	163	
精検受診者数	194	188	166	124	95	
精検受診率 (%)	85.1	81.7	81.0	76.1	58.3	
	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率			
異常なし	21 9.72%	14 6.60%	24 12.63%	8 6.02%	11 10.68%	
動脈瘤 (5mm以上)	3 1.39%	4 1.89%	1 0.53%	0 0.00%	1 0.97%	
動脈瘤 (5mm未満)	43 19.91%	47 22.17%	17 8.95%	17 12.78%	17 16.50%	
悪性腫瘍	0 0.00%	1 0.47%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	
新規脳梗塞	1 0.46%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	
陳旧性脳梗塞	43 19.91%	46 21.70%	61 32.11%	32 24.06%	12 11.65%	
陳旧性脳出血	8 3.70%	8 3.77%	8 4.21%	8 6.02%	2 1.94%	
血管腫	6 2.78%	3 1.42%	5 2.63%	2 1.50%	2 1.94%	
脳萎縮・認知症	6 2.78%	14 6.60%	9 4.74%	1 0.75%	1 0.97%	
慢性虚血性変化	11 5.09%	12 5.66%	8 4.21%	7 5.26%	5 4.85%	
耳鼻領域疾患	13 6.02%	15 7.08%	10 5.26%	19 14.29%	8 7.77%	
その他の腫瘍様疾患	10 4.63%	9 4.25%	12 6.32%	8 6.02%	11 10.68%	
その他の主要動脈疾患	29 13.43%	28 13.21%	27 14.21%	12 9.02%	16 15.53%	
その他の疾患	12 5.56%	7 3.30%	6 3.16%	9 6.77%	7 6.80%	
その他	10 4.63%	4 1.89%	2 1.05%	10 7.52%	10 9.71%	


脳ドックの総受診者数は1,002人で、MRI検査ではA（異常なし）は284人（28.3%）、B（軽度異常）は531人（53.0%）、C（要観察）は75人（7.5%）、D（要医療）は112人（11.2%）であった。MRA検査ではA（異常なし）は796人（79.4%）、B（軽度異常）は105人（10.5%）、C（要観察）は40人（4.0%）、D（要医療）は61人（6.1%）であった。頸動脈超音波検査ではA（異常なし）は500人（49.9%）、B（軽度異常）は327人（32.6%）、C（要観察）は171人（17.1%）、D（要医療）は4人（0.4%）であった。悪性腫瘍、新規脳梗塞と診断された者はいなかった。

D（要医療）の163人のうち精検受診者数は95人であり、精検受診率は58.3%であった。

3-1-3 基本健診■


【年代別受診者数】 (人)

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	568	339	326	264	106	3	1,606
女	574	346	263	154	56	3	1,396
合計	1,142	685	589	418	162	6	3,002
構成比	38.04%	22.82%	19.62%	13.92%	5.40%	0.20%	100.00%



【月別受診者数】 (人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	99	-	306	331	296	284	330	281	168	254	277	376	3,002




【検査結果】


(人)

判定	A (異常なし)		B (軽度異常)		C (要観察)		D (要医療)		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	1,549	1,338	10	24	22	20	25	14	1,606	1,396
身体計測	830	904	-	-	776	492	-	-	1,606	1,396
視 力	558	469	-	-	434	396	614	531	1,606	1,396
聴 力	1,194	1,274	-	-	73	31	339	90	1,606	1,395
血 圧	837	1,039	307	152	309	137	153	68	1,606	1,396
血液一般	881	798	570	315	67	142	87	141	1,605	1,396
肝機能	944	1,243	248	73	132	29	281	51	1,605	1,396
脂質代謝	627	748	413	307	418	233	147	108	1,605	1,396
糖代謝	473	708	675	499	341	161	117	28	1,606	1,396
腎機能	1,440	1,299	-	-	145	91	20	6	1,605	1,396
尿一般	1,314	1,040	214	173	50	75	26	106	1,604	1,394
安静心電図	714	878	504	299	257	164	131	55	1,606	1,396
胸部X線	1,175	1,099	360	236	54	29	16	13	1,605	1,377

(男)




(女)



総合判定


判定	(人)		
	男	女	合計
A (異常なし)	6	20	26
B (軽度異常)	88	92	180
C (要観察)	417	463	880
D (要医療)	1,095	821	1,916
合計	1,606	1,396	3,002



【D判定延べ人数】

検査項目	(人)		
	男	女	合計
診察	25	14	39
身体計測	—	—	—
視力	614	531	1,145
聴力	339	90	429
血圧	153	68	221
血液一般	87	141	228
肝機能	281	51	332

検査項目	(人)		
	男	女	合計
脂質代謝	147	108	255
糖代謝	117	28	145
腎機能	20	6	26
尿一般	26	106	132
心電図	131	55	186
胸部X線	16	13	29



【BMI・腹囲による判定（痩せ・肥満）】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	830	904	1,734
C1群（要観察）	70	219	289
C2群（要観察）	706	273	979
合計	1,606	1,396	3,002




【A群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】


(人)

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	64	112	32	76	26	69	6	23	6	5	2	1	136	286
B（軽度異常）	59	63	73	62	68	97	53	70	24	19	9	8	286	319
C（要観察）	32	21	47	20	63	39	57	55	58	46	24	19	281	200
D（要医療）	15	20	17	12	18	14	33	24	31	19	13	10	127	99
合計	170	216	169	170	175	219	149	172	119	89	48	38	830	904

(男)



(女)




【C1群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】


(人)

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	9	48	6	29	3	14	2	3	1	1	0	0	21	95
B (軽度異常)	6	15	2	12	5	22	4	13	5	5	1	2	23	69
C (要観察)	2	4	2	3	2	8	1	10	7	4	1	2	15	31
D (要医療)	0	4	0	6	2	5	4	2	3	4	2	3	11	24
合計	17	71	10	50	12	49	11	28	16	14	4	7	70	219

(男)



(女)




【C2群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】


(人)

生活習慣病判定	～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	7	8	9	7	5	7	1	1	1	1	0	0	23	24
B (軽度異常)	29	13	38	19	42	23	24	10	10	5	2	0	145	70
C (要観察)	19	5	67	12	55	37	78	31	64	26	34	7	317	118
D (要医療)	10	0	23	3	50	11	63	21	54	19	21	7	221	61
合計	65	26	137	41	152	78	166	63	129	51	57	14	706	273

(男)




(女)



【生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	（人）		
	男	女	合計
血圧	4	3	7
脂質代謝	7	20	27
糖代謝	2	2	4

C2群	（人）		
	男	女	合計
血圧	102	36	138
脂質代謝	81	23	104
糖代謝	82	18	100



基本健診の受診者数は男性1,606人、女性1,396人で総受診者数は3,002人であった。総合判定別ではA（異常なし）が26人（0.9%）、B（軽度異常）が180人（6.0%）、C（要観察）が880人（29.3%）、D（要医療）が1,916人（63.8%）であった。視力・聴力・肝機能の3項目でD（要医療）が多く、視力が1,145人、聴力が429人、肝機能が332人であった。

BMIと腹囲による判定（痩せ・肥満）

A群（異常なし）は1,734人（57.8%）、C1群（要観察）は289人（9.6%）、C2群（要観察）は979人（32.6%）であった。

各群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性281人、女性200人で合計481人（27.7%）、D（要医療）は男性127人、女性99人で合計226人（13.0%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性15人、女性31人で合計46人（15.9%）、D（要医療）は男性11人、女性24人で合計35人（12.1%）であった。C2群（要観察）においては、C（要観察）は男性317人、女性118人で合計435人（44.4%）、D（要医療）は男性221人、女性61人で合計282人（28.8%）であった。


生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較

C1群（要観察）とC2群（要観察）において、D（要医療）と判定されたのは、C1群（要観察）では女性の脂質代謝が多く、C2群（要観察）では男性の血圧、脂質代謝、糖代謝すべての項目において多かった。

3-1-4 特定健診■


【年代別受診者数（総合保健医療センター実施分）】 (人)

性別	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
男	10	7	6	4	8	22	24	81
女	14	9	7	4	17	27	32	110
合計	24	16	13	8	25	49	56	191
構成比	12.57%	8.38%	6.81%	4.19%	13.09%	25.65%	29.31%	100.00%



【月別受診者数（総合保健医療センター実施分）】 (人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	-	1	2	18	24	26	24	96	0	0	0	191



【年代別受診者数（保健センター実施分）】

(人)


性別	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
男	2	2	7	1	6	20	51	89
女	2	6	10	7	14	47	54	140
合計	4	8	17	8	20	67	105	229
構成比	1.75%	3.49%	7.42%	3.49%	8.73%	29.26%	45.86%	100.00%



【月別受診者数（保健センター実施分）*1】

(人)



月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	-	0	50	0	54	49	49	27	0	0	0	229



【検査結果（両センター実施分）】


(人)

判定	A（異常なし）		B（軽度異常）		C（要観察）		D（要医療）		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	157	233	2	6	0	2	11	9	170	250
身体計測	81	171	-	-	89	79	-	-	170	250
眼底	11	7	1	3	0	1	4	1	16	12
血 圧	68	126	35	41	49	54	18	29	170	250
血液一般	68	84	82	130	11	20	9	16	170	250
肝機能	119	221	30	9	8	14	13	6	170	250
脂質代謝	60	74	48	61	55	96	7	19	170	250
糖代謝	50	96	61	103	43	43	16	8	170	250
腎機能	134	202	-	-	34	45	2	3	170	250
尿一般	133	186	17	35	12	17	7	11	169	249
安静心電図	88	157	33	39	30	39	19	15	170	250

(男)
人(女)
人

総合判定


(人)			
判定	男	女	合計
A (異常なし)	0	3	3
B (軽度異常)	16	31	47
C (要観察)	84	125	209
D (要医療)	70	91	161
合計	170	250	420



【D判定延べ人数】

(人)			
検査項目	男	女	合計
診察	11	9	20
身体計測	—	—	—
眼底	4	1	5
血圧	18	29	47
血液一般	9	16	25
肝機能	13	6	19

(人)			
検査項目	男	女	合計
脂質代謝	7	19	26
糖代謝	16	8	24
腎機能	2	3	5
尿一般	7	11	18
心電図	19	15	34



【BMI・腹囲による判定（痩せ・肥満）】


判定基準

A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）


(人)			
判定	男	女	合計
A群（異常なし）	81	171	252
C1群（要観察）	8	32	40
C2群（要観察）	81	47	128
合計	170	250	420




【A群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】

生活習慣病判定	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	2	8	1	5	3	5	3	1	9	19
B（軽度異常）	2	8	3	5	7	22	8	9	20	44
C（要観察）	5	6	3	8	12	36	20	25	40	75
D（要医療）	0	0	1	2	6	12	5	19	12	33
合計	9	22	8	20	28	75	36	54	81	171

(男)




(女)




【C1群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】 (人)

生活習慣病判定	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2
B (軽度異常)	0	1	0	1	3	7	0	3	3	12
C (要観察)	0	1	0	1	0	5	3	6	3	13
D (要医療)	1	0	0	0	0	0	0	5	1	5
合計	1	2	1	2	3	14	3	14	8	32

(男) 年齢




(女) 年齢




【C2群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】 (人)

生活習慣病判定	40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A (異常なし)	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
B (軽度異常)	3	0	2	2	3	3	8	2	16	7
C (要観察)	5	2	5	3	17	6	16	13	43	24
D (要医療)	3	4	2	1	4	7	12	3	21	15
合計	11	7	9	6	25	16	36	18	81	47

(男)




(女)



【生活習慣病判定(D判定)におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)			C2群	(人)		
	男	女	合計		男	女	合計
血压	0	4	4	血压	13	9	22
脂質代謝	0	1	1	脂質代謝	5	4	9
糖代謝	1	0	1	糖代謝	9	2	11



特定健診の受診者数は男性170人、女性250人で総受診者数は420人であり、総合判定別ではA（異常なし）が3人（0.7%）、B（軽度異常）が47人（11.2%）、C（要観察）が209人（49.8%）、D（要医療）が161人（38.3%）であった。血压・心電図・脂質代謝の3項目でD（要医療）が多く、血压が47人で、心電図が34人、脂質代謝が26人であった。

BMIと腹囲による判定（痩せ・肥満）

A群（異常なし）は252人（60.0%）、C1群（要観察）は40人（9.5%）、C2群（要観察）は128人（30.5%）であった。

各群における生活習慣病判定（血压・脂質代謝・糖代謝）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性40人、女性75人で合計115人（45.6%）、D（要医療）は男性12人、女性33人で合計45人（17.9%）であった。C1群（要観察）において、C（要観察）は男性3人、女性13人で合計16人（40.0%）、D（要医療）は男性1人、女性5人で合計6人（15.0%）であった。C2群（要観察）において、C（要観察）は男性43人、女性24人で合計67人（52.3%）、D（要医療）は男性21人、女性15人で合計36人（28.1%）であった。


生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較

C1群（要観察）とC2群（要観察）において、D（要医療）と判定されたのは、C1群（要観察）では女性の血压が多く、C2群（要観察）では血压、糖代謝で多かった。

3-1-5 生活習慣病予防健診■


【年代別受診者数】 (人)

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	0	1	0	0	0	0	1
女	0	1	3	0	0	0	4
合計	0	2	3	0	0	0	5
構成比	0.00%	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



【月別受診者数】 (人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	1	-	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5




【検査結果】

(人)

判定	A (異常なし)		B (軽度異常)		C (要観察)		D (要医療)		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4
身体計測	1	2	-	-	0	2	-	-	1	4
血 圧	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4
血液一般	0	4	1	0	0	0	0	0	1	4
肝機能	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4
脂質代謝	0	2	0	1	1	1	0	0	1	4
糖代謝	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4
腎機能	1	4	-	-	0	0	0	0	1	4
尿一般	1	2	0	0	0	0	0	2	1	4
安静心電図	1	3	0	0	0	1	0	0	1	4


(男)

人



(女)

人




3-1-6 ヤング健診■

【月別受診者数（総合保健医療センター実施分）】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	11	-	7	7	6	17	16	21	39	39	29	19	211



【月別受診者数（保健センター実施分）】

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	0	-	13	0	15	0	0	27	0	17	11	0	83




【検査結果(両センター実施分)】


(人)

判定	A (異常なし)		B (軽度異常)		C (要観察)		D (要医療)		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
診 察	67	211	2	7	0	1	2	4	71	223
身体計測	38	144	-	-	33	79	-	-	71	223
血 圧	53	207	10	9	8	5	0	2	71	223
血液一般	51	124	19	47	0	32	1	20	71	223
肝機能	49	211	9	9	5	2	8	1	71	223
脂質代謝	38	144	13	40	18	25	2	14	71	223
糖代謝	43	162	23	55	4	5	1	1	71	223
腎機能	70	222	-	-	1	1	0	0	71	223
尿一般	67	146	4	31	0	13	0	33	71	223
安静心電図	37	163	22	38	9	17	3	5	71	223

(男)




(女)



総合判定


(人)			
判定	男	女	合計
A (異常なし)	6	17	23
B (軽度異常)	15	44	59
C (要観察)	37	93	130
D (要医療)	13	69	82
合計	71	223	294



【D判定延べ人数】

(人)			
検査項目	男	女	合計
診察	2	4	6
身体計測	—	—	—
血圧	0	2	2
血液一般	1	20	21
肝機能	8	1	9

(人)			
検査項目	男	女	合計
脂質代謝	2	14	16
糖代謝	1	1	2
腎機能	0	0	0
尿一般	0	33	33
心電図	3	5	8



【BMI・腹囲による判定（痩せ・肥満）】

判定基準


A群（異常なし）

C1群（要観察）：BMI 18.4以下

C2群（要観察）：BMI 25.0以上 または 腹囲（男：85.0cm以上、女：90.0cm以上）

(人)

判定	男	女	合計
A群（異常なし）	38	144	182
C1群（要観察）	9	52	61
C2群（要観察）	24	27	51
合計	71	223	294




【各群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）】


(人)

生活習慣病判定	A群		C1群		C2群		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
A（異常なし）	16	72	5	24	3	6	24	102
B（軽度異常）	11	43	2	21	6	10	19	74
C（要観察）	10	17	2	4	13	9	25	30
D（要医療）	1	12	0	3	2	2	3	17
合計	38	144	9	52	24	27	71	223

(男)




(女)



【生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較】

C1群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	0	0
脂質代謝	0	3	3
糖代謝	0	0	0

C2群	(人)		
	男	女	合計
血圧	0	1	1
脂質代謝	1	0	1
糖代謝	1	1	2



ヤング健診の受診者数は男性71人、女性223人で総受診者数は294人であり、総合判定別ではA（異常なし）が23人（7.8%）、B（軽度異常）が59人（20.1%）、C（要観察）が130人（44.2%）、D（要医療）が82人（27.9%）であった。尿一般・血液一般・脂質代謝の3項目でD（要医療）が多く、尿一般が33人、血液一般が21人、脂質代謝が16人であった。

BMIと腹囲による判定（痩せ・肥満）

A群（異常なし）は182人（61.9%）、C1群（要観察）は、61人（20.8%）、C2群（要観察）は51人（17.3%）であった。

各群における生活習慣病判定（血圧・脂質代謝・糖代謝）

A群（異常なし）において、C（要観察）は男性10人、女性17人で合計27人（14.8%）、D（要医療）は男性1人、女性12人で合計13人（7.1%）、C1群（要観察）において、C（要観察）は男性2人、女性4人で合計6人（9.8%）、D（要医療）は男性0人、女性3人で合計3人（4.9%）、C2群（要観察）において、C（要観察）は男性13人、女性9人で合計22人（43.1%）、D（要医療）は男性2人、女性2人で合計4人（7.8%）であった。


生活習慣病判定D（要医療）におけるC1群とC2群の比較

C1群（要観察）とC2群（要観察）においてD（要医療）と判定されたのは、C1群（要観察）では女性の脂質代謝が多く、C2群（要観察）では男性の脂質代謝、糖代謝、女性の血圧、糖代謝であった。

3-1-7 骨密度検査■


【年代別受診者数】 (人)

性別	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
男	0	86	115	302	1,058	392	1,953
女	2	158	197	607	948	148	2,060
合計	2	244	312	909	2,006	540	4,013
構成比	0.05%	6.08%	7.77%	22.65%	49.99%	13.46%	100.00%





【月別受診者数】 (人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	152	-	407	484	301	426	495	432	338	265	314	399	4,013



【検査結果】


判定	(人)													
	～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳～		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
異常なし	0	0	51	121	59	96	176	147	545	178	153	19	984	561
要指導	0	2	32	34	44	77	103	316	388	485	161	77	728	991
要精検	0	0	3	3	12	24	23	144	125	285	78	52	241	508
合計	0	2	86	158	115	197	302	607	1,058	948	392	148	1,953	2,060



3-1-8 乳がん検査■


【年代別受診者数】 (人)

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	124	558	419	546	426	21	2,094
構成比	5.92%	26.66%	20.01%	26.07%	20.34%	1.00%	100.00%





【月別受診者数】 (人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	52	45	136	228	184	217	225	210	218	178	188	213	2,094



年度別精密検査分析



年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
						異常なし	がん	がん以外		
28	2,738	175	6.39	154	88.00	70	11	73	0.40	6.29
29	2,734	173	6.33	157	90.75	61	5	91	0.18	2.89
30	2,749	132	4.80	120	90.91	48	11	61	0.40	8.33
1	2,614	116	4.44	107	92.24	40	10	57	0.38	8.62
2	2,094	97	4.63	91	93.81	36	4	51	0.19	4.12



【検査結果】

(人)


判定	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
精査不要（異常なしを含む）	112	530	387	529	418	21	1,997
要精検	12	28	32	17	8	0	97
合計	124	558	419	546	426	21	2,094



【所見】

(人)

所見	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
異常なし	112	530	387	529	418	21	1,997
石灰化	18	60	55	52	33	2	220
腫瘍	1	19	21	18	13	1	73
局所的非対称性陰影	8	11	17	6	1	0	43
構築の乱れ	1	4	4	5	8	0	22
その他	0	0	0	0	0	0	0




【精密検査結果】

(件)

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
要精検者数	12	28	32	17	8	0	97
精検受診者数	12	25	31	15	8	0	91
異常なし	7	7	11	7	4	0	36
乳がん	0	2	0	1	1	0	4
線維腺腫	1	6	5	1	0	0	13
乳腺症	4	4	10	3	2	0	23
乳管内乳頭腫	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	8	7	5	1	0	21

複数回答あり



【精密検査結果5年比較】					(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
要精検者数	175	173	132	116	97
精検受診者数	154	157	120	107	91
精検受診率 (%)	88.0	90.8	90.9	92.2	93.8

	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率		
異常なし	70	61	48	40	36
	42.42%	35.06%	36.36%	33.90%	37.11%
乳がん	11	5	11	10	4
	6.67%	2.87%	8.33%	8.47%	4.12%
線維腺腫	26	32	19	21	13
	15.76%	18.39%	14.39%	17.80%	13.40%
乳腺症	25	37	25	21	23
	15.15%	21.26%	18.94%	17.80%	23.71%
乳管内乳頭腫	0	0	1	0	0
	0.00%	0.00%	0.76%	0.00%	0.00%
その他	33	39	28	26	21
	20.00%	22.41%	21.21%	22.03%	21.65%

乳がん検査の総受診者数は2,094人で、「精査不要（異常なしを含む）」は1,997人(95.4%)、「要精検」は97人(4.6%)であった。


「要精検」のうち精検受診者数は91人であり、精検受診率は93.8%であった。

また、がん発見率は0.19%、陽性反応的中度は4.12%であった。

【年代別受診者数(医師会依頼による乳房X線撮影)】

(人)


年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	82	101	117	59	66	12	437



【月別受診者数(医師会依頼による乳房X線撮影)】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	7	20	46	62	33	38	73	43	32	23	40	20	437



3-1-9 子宮がん検査■


【年代別受診者数】

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
人数	105	378	284	430	335	15	1,547
構成比	6.79%	24.43%	18.36%	27.80%	21.65%	0.97%	100.00%





【月別受診者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人数	48	34	114	165	142	154	156	129	154	139	132	180	1,547



年度別精密検査分析



年度	受診者数 (人)	要精検者数 (人)	要精検率 (%)	精検受診者数 (人)	精検受診率 (%)	精密検査結果(人)			がん発見率 (%)	陽性反応 的中度(%)
						異常なし	がん	がん以外		
28	1,879	5	0.27	2	40.00	1	0	1	0.00	0.00
29	2,004	19	0.95	16	84.21	6	2	8	0.10	10.53
30	2,177	30	1.38	21	70.00	7	3	11	0.14	10.00
1	2,082	32	1.54	23	71.88	8	0	15	0.00	0.00
2	1,547	23	1.49	21	91.30	9	2	10	0.13	8.70



【検査結果】

(人)

判定	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
異常なし	101	369	278	430	331	15	1,524
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0
要精検	4	9	6	0	4	0	23
合計	105	378	284	430	335	15	1,547




【精密検査結果】

(件)

年齢	～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～	合計
要精検者数	4	9	6	0	4	0	23
精検受診者数	4	8	6	0	3	0	21
異常なし	0	3	4	0	2	0	9
子宮頸がん	1	1	0	0	0	0	2
子宮体がん	0	0	0	0	0	0	0
上皮内腫瘍	3	3	2	0	1	0	9
異形成	0	1	0	0	0	0	1
その他のがん	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0

複数回答あり



【精密検査結果5年比較】						(人)
年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	
要精検者数	5	19	30	32	23	
精検受診者数	2	16	21	23	21	
精検受診率 (%)	40.0	84.2	70.0	71.9	91.3	
	(上段) 回答数		(下段) 回答内訳率			
	1	6	7	8	9	
異常なし	50.00%	37.50%	33.33%	34.78%	42.86%	
子宮頸がん	0	2	3	0	2	
	0.00%	12.50%	14.29%	0.00%	9.52%	
子宮体がん	0	0	0	0	0	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
上皮内腫瘍	0	5	8	12	9	
	0.00%	31.25%	38.10%	52.17%	42.86%	
異形成	0	0	2	1	1	
	0.00%	0.00%	9.52%	4.35%	4.76%	
その他のがん	0	0	0	0	0	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
その他の疾患	1	3	1	2	0	
	50.00%	18.75%	4.76%	8.70%	0.00%	

子宮がん検査の総受診者数は1,547人で、「異常なし」は1,524人(98.5%)、「その他の疾患」は
おらず、「要精検」は23人(1.5%)であった。

「要精検」のうち精検受診者数は21人であり、精検受診率は91.3%であった。

また、がん発見率は0.13%、陽性反応的中度は8.70%であった。


3-1-10 指導実施状況■

人間ドックの結果は、受診当日に医師が身体計測値、血圧値、血液・尿検査値等の結果説明を行い、その後、必要に応じて保健師、管理栄養士が個別保健指導を行っている。健診結果報告書は後日郵送し、希望者は後日、医師から結果説明を受ける。

【医師による後日結果説明実施者数】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人間ドック	12	1	10	36	32	19	40	29	18	16	10	20	243
脳ドック	3	1	7	14	12	20	15	13	11	8	9	14	127
乳がん検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
子宮がん検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
ヤング健診	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
合計	15	2	17	50	44	40	55	42	30	26	19	36	376



【保健師、管理栄養士による個別保健指導実施者数】

(人)


月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人間ドック	182	0	595	649	480	543	585	539	457	373	416	511	5,330
ヤング健診	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
合計	182	0	595	649	480	544	585	539	457	374	416	511	5,332



【特定保健指導実施者数の5年比較（総合保健医療センター実施分）】

(人)


年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
動機付け支援	543	541	585	723	546
積極的支援	251	266	285	274	276
合計	794	807	870	997	822



【人間ドック受診者への保健指導数の5年比較】

(人)


年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
人間ドック保健指導	3,328	4,978	5,406	6,164	5,330
人間ドック受診者数	9,566	9,625	9,631	9,476	7,395
実施率 (%)	34.79	51.72	56.13	65.05	72.08



【特定保健指導実施率の推移】

(%) (人)

年度	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年
特定保健指導終了者	267	266	299	423	289
特定保健指導対象者	565	535	552	521	440
特定保健指導実施率*5	47.26%	49.72%	54.17%	81.19%	65.68%
春日井市実施率目標値*6			24.00%	27.00%	27.00%



平成26年6月の総合保健医療センター開所時から、人間ドック受診者のうち、特定健診対象者に対し特定保健指導の初回面接を当日に実施している。


特定保健指導実施率は毎年増加しており、平成30年度より変更可能となった実績評価時期について、当センターにおいても令和元年4月から実績評価時期を6か月以降（28週）から3か月以降（15週）に変更したことで令和元年度は一時的に81.19%と大幅に増加した。令和2年度は実績評価時期の変更が定着したことで例年の水準に近くなったが、5月の健診休止期間中にも電話による指導を実施したこともあり、平成30年度と比べて11.51%増加した。これは、春日井市国民健康保険特定健康診査等実施計画で定められた春日井市実施率目標値の27.00%を大きく上回っている。

*5 「当該年度の動機付け支援・積極的支援の終了者」の数を、「当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援・積極的支援の対象とされた者」の数で除した割合

*6 春日井市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第3期2018～2023年）を参照

【特定保健指導実施者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	44	36	69	46	18	47	51	41	57	48	39	50	546
積極的支援	16	13	13	18	21	18	22	21	22	35	35	42	276
合計	60	49	82	64	39	65	73	62	79	83	74	92	822




【人間ドック受診者の特定保健指導対象者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	12	-	35	36	23	31	25	32	35	26	26	26	307
積極的支援	2	-	5	7	14	10	14	10	14	24	15	18	133
合計	14	-	40	43	37	41	39	42	49	50	41	44	440


【初回面接実施者数】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動機付け支援	7	-	30	27	18	23	21	25	26	23	21	19	240
積極的支援	2	-	5	7	13	7	11	10	15	22	15	17	124
合計	9	-	35	34	31	30	32	35	41	45	36	36	364

人間ドック受診者の特定保健指導対象者数




初回面接実施者数



人間ドック受診者の内訳

7,395人



特定保健指導対象者の内訳

440人

